

Leucanthemum White Lion F₁

(*Leucanthemum x superbum*)

Teelt van vaste planten (herzien/aangepast 20-01-21)

Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Zon	Vroege voorjaar, Voorjaar, Late voorjaar, Zomer, Nazomer	8-10 in. (20-25 cm)	8-12 in. (20-30 cm)	12 in. (30 cm)

Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Aantal dagen van 50% tot maximale kieming	pH-/EC-waarden (1:2) zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
RAW	288 72	1 4	6-7 7-8	4-10	5,5-6,2 pH 0,2-0,5 mmhos/cm	Optioneel

Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
Vochtigheid substraat	Niveau 4	Niveau 3-4	Niveau 2-3	Niveau 2-3
Temperatuur	68-77°F (20-25°C)	65-68°F (18-20°C)	65-68°F (18-20°C)	60-65°F (16-18°C)
Licht	Optioneel	3.000-5.000 f.c. (32.300-53.800 Lux)	5.000-7.000 f.c. (53.800-75.300 Lux)	5.000-7.000 f.c. (53.800-75.300 Lux)
Bemesten		Minder dan 100 ml N (EC lager dan 0,7)	100 tot 175 ml N (EC 0,7 tot 1,2)	100 tot 175 ml N (EC 0,7 tot 1,2)

Vernalisatie / Koelperiode

Nee

Juvenile stadium

Ongeveer 10 echte bladeren

Bemestingsaanbeveling

Gebruik een goed uitgebalanceerde calciumnitraatmeststof. Bemest niet continu om een te hoge zoutgehalte te voorkomen. Het substraat kan het beste met enige regelmaat doorgespoeld worden.

Belangrijke tips voor vermeerdering

Maak geen gebruik van snel oplosbare zouten. Voorzie in een actief klimaat met een goede luchtdoorstroming en tamelijk veel licht. Houd de planten niet te lang in de pluggenfase, omdat oude pluggen na het oppotten ongelijkmatig weggroeien.

Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH-/EC-waarden (1:2) teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
(dag) 65-72°F (18-22°C) (nacht) 57-60°F (14-16°C)	5,5-6,2 pH 0,9-1,1 mmhos/cm	100 tot 175 ml N (EC 0,7 tot 1,2)	Facultatieve langedag

Aanbevolen daglengte

Facultatieve langedagplant met een kritische daglengte van 10 uur. Reageert echter zeer matig op de daglengte.

Teeltplanning

Type gewas	Potmaat / Containermaat	Planten per pot	Teeltduur	Seizoen	Groeieregulatoren
Overwintering	4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	18-19 (weken)	Vroege voorjaar, Gemiddelde dagtemperatuur 65° F (18°C)	-
Eenjarig	4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	9-10 (weken)	Voorjaar, Gemiddelde dagtemperatuur 68°F (20° C)	daminozide 2.500 ppm Spuiten
Overwintering	5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	18-19 (weken)	Vroege voorjaar, Gemiddelde dagtemperatuur 65° F (18°C)	-
Eenjarig	5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	10-11 (weken)	Voorjaar, Gemiddelde dagtemperatuur 68°F (20° C)	daminozide 2.500 ppm Spuiten

Bemestingsaanbeveling

Gebruik een goed uitgebalanceerde calcium-nitraatmeststof. in een dosering van 140 tot 160 mg/l. Voorkom een te hoog gehalte aan oplosbare zouten. Het substraat kan het beste met enige regelmaat doorgespoeld worden.

Gevoeligheid voor gewasbeschermingsmiddelen

Pas geen abamectine toe en voorkom elk contact van de werkzame stof met het gewas (zelfs gas uit naburige kascompartimenten). Dat kan het einde van de teelt betekenen.

Ziekten en plagen

Het onregelmatig weggroeien kan het gevolg zijn van oude pluggen of een hoog zoutgehalte.

Teeltmaatregelen voor meer bossige (vertakte) planten

Teel onder de aanbevolen temperatuur. Plan de teelt voor afzet vroeg in het voorjaar, wanneer de natuurlijke daglengtes kort zijn. Voor de teelt als eenjarige kan het in een vroeg stadium spuiten van Configure in een dosering van 300 mg/l de vertakking bevorderen.

Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Gebruik voor 7,5 l containers 3 tot 4 pluggen.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

Foto's ras



White Lion



White Lion



White Lion

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2021 Ball Horticultural Company