

## Pepper Snackabelle Red F<sub>1</sub>

(*Capsicum annuum*)

Teelt van groentegewassen (herzien/aangepast 19-01-21)

### Algemene informatie

| Blootstelling | Bloeiperiode         | Hoogte                  | Breedte                 | Plantafstand            |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zon           | Late voorjaar, Zomer | 18-24 in.<br>(46-61 cm) | 12-18 in.<br>(30-46 cm) | 12-18 in.<br>(30-46 cm) |

### Kieming

| Zaadproductvorm | Aanbevolen plugmaat | Zaden/plug | Duur pluggenteelt (in weken) | Aantal dagen van 50% tot maximale kieming | pH-/EC-waarden (1:2) zaaisubstraat | Afdekken van het zaad |
|-----------------|---------------------|------------|------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|
| RAW             | 288                 | 1          | 5-6                          | 5-7                                       | 5,8-6,2 pH<br>0,75 mmhos/cm        | Lichte afdekking      |

### Pluggenteelt

|                              | Ontwikkelingsstadium 1                    | Ontwikkelingsstadium 2                    | Ontwikkelingsstadium 3                  | Ontwikkelingsstadium 4                  |
|------------------------------|---|---|---|---|
| <b>Vochtigheid substraat</b> | Niveau 4                                  | Niveau 3-4                                | Niveau 2-4                              | Niveau 2-4                              |
| <b>Temperatuur</b>           | 70-78°F<br>(21-26°C)                      | 68-72°F<br>(20-22°C)                      | 65-70°F<br>(18-21°C)                    | 62-67°F<br>(17-19°C)                    |
| <b>Licht</b>                 | Optioneel                                 | 1.000-2.500 f.c.<br>(10.800-26.900 Lux)   | 1.000-2.500 f.c.<br>(10.800-26.900 Lux) | 2.500-5.000 f.c.<br>(26.900-53.800 Lux) |
| <b>Bemesten</b>              | Minder dan 100 ml N<br>(EC lager dan 0,7) | Minder dan 100 ml N<br>(EC lager dan 0,7) | 100 tot 175 ml N<br>(EC 0,7 tot 1,2)    | 100 tot 175 ml N<br>(EC 0,7 tot 1,2)    |

### Bemestingsaanbeveling

*Capsicum annuum* is tijdens de kieming zeer gevoelig voor hoge zoutgehaltes, in het bijzonder voor een teveel aan ammonium. Houd een ammoniumgehalte aan van minder dan 10 mg/l.

### Belangrijke tips voor vermeerdering

Lengtegroei kan worden beheerst door minder te bemesten, te veel water te voorkomen, telen onder hoge lichtintensiteit en indien mogelijk DIF toe te passen. Pas indien nodig tegen het strekken 2 weken na het zaaien 2,5 tot 5,0 mg/l uniconazool (Sumagic) toe. Herhaal zondig na 2 weken.

### Teelt tot eindproduct

| Teelttemperatuur                 | pH-/EC-waarden (1:2) teeltsubstraat | Bemesten         | Daglengte |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------|
| <b>(dag)</b> 68-80°F (20-27°C)   | 5,5-6,2 pH                          | 100 tot 175 ml N | -         |
| <b>(nacht)</b> 65-70°F (18-21°C) | 1,0 mmhos/cm                        | (EC 0,7 tot 1,2) |           |

### Aantal dagen tot groene vruchten

55-60

### Aantal dagen tot rijpe vruchten

70-75

## Teeltplanning

| Potmaat / Containermaat    | Planten per pot | Teeltduur   | Seizoen  | Groeiregulatoren |
|----------------------------|-----------------|-------------|----------|------------------|
| Multiplaat/Tray (Cup Pack) | 1 (ppp)         | 4-6 (weken) | Voorjaar | -                |
| 4"/4,5"/Quart              | 1 (ppp)         | 4-6 (weken) | Voorjaar | -                |
| 5"/6"/1 Gallon             | 1 (ppp)         | 5-7 (weken) | Voorjaar | -                |

### Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Goede teeltresultaten bij een vollegrondsteelt of een teelt in containers, met of zonder steun.

**OPMERKING:** Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

## Foto's ras



Snackabelle  
Red



Snackabelle  
Red



Snackabelle  
Red

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2023 Ball Horticultural Company