

Ageratum Série High Tide™ F₁

(*Ageratum houstonianum*)

Culture Plantes Annuelles (mis à jour 10/01/18)

Plug crop time: 4 weeks

Transplant to finish: 7 to 9 weeks

- Dense, mounded hedge of colour is taller and more vigorous than other landscape ageratum.
- Outlasts standard bedding types in gardens and mixed containers.
- Strong branching fills out packs and pots quickly.
- Self-cleaning and easy-care.
- Also well-suited to indoor plant programs.

Informations générales

Exposition	Période de floraison	Hauteur	Largeur	Distance de plantation
Soleil	Printemps, Été, Fin de l'été	14-16 in. (36-41 cm)	12 in. (30 cm)	12-18 in. (30-46 cm)

Germination

Type de semence	Taille de de mottes recommandée	Graines/alvéole	Durée de culture du jeune plant (en semaines)	Jours jusqu'à la germination	pH/EC du substrat de semis	Couvrir le semis
PEL	288	1	4-5	3	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Non

Production du jeune plant

	Stade 1	Stade 2	Stade 3	Stade 4
Humidité du substrat	Niveau 4	Niveau 3-4	Niveau 3-4	Niveau 3
Températures	72-75°F 22-24°C	65-70°F 18-21°C	65-70°F 18-21°C	60-65°F 16-18°C
Lumière	Facultatif	1 000-2 500 f.c. (10 800-26 900 Lux)	1 000-2 500 f.c. (10 800-26 900 Lux)	2 500-5 000 f.c. (26 900-53 800 Lux)
Fertilisation		Inférieur à 100 ppm de N - Moins de 0,7 EC	100 à 175 ppm de N - 0,7 à 1,2 EC	100 à 175 ppm de N - 0,7 à 1,2 EC

Conseils pour la multiplication

Ne pas laisser les plantules flétrir, car l'agérum n'aime pas le stress hydrique.

Culture de la plante finie

Culture de la plante finie : températures	pH/EC substrat de culture	Fertilisation	Longueur du jour
(jour) 70-80°F/21-27°C (nuit) 58-62°F/14-17°C	5,8-6,2 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	175 à 225 ppm de N - 1,2 à 1,5 EC	Jour long facultatif

Planning de culture

Taille du pot	Plantes/pot	Durée de culture	Saison	Régulateurs de croissance
Plaque 306	1 (ppp)	7-9 (semaines)	Fin du printemps	daminozide 2 500-3 500 ppm Pulvérisation
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	7-9 (semaines)	Fin du printemps	daminozide 2 500-3 500 ppm Pulvérisation
5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	7-9 (semaines)	Fin du printemps	daminozide 2 500-3 500 ppm Pulvérisation

Recommandations de fertilisation

Fertiliser la culture chaque semaine à 175 à 225 ppm de N avec un engrais complet équilibré.

Problèmes courants

Insectes : Thrips, pucerons, mouches blanches

NOTE : Les producteurs doivent utiliser les informations présentées ici uniquement comme des recommandations. PanAmerican Seed conseille aux producteurs de faire un essai avec les produits dans leurs propres conditions individuelles. Les durées de culture varie en fonction du climat, du lieu, du moment de l'année, et des conditions environnementales sous serre. Il incombe au producteur de lire et de suivre toutes les instructions figurant sur l'étiquette concernant les produits. Rien dans le présent document ne doit être considéré comme une garantie d'aucune sorte de PanAmerican Seed pour les produits cités ici. Les conditions générales de vente de PanAmerican Seed s'appliqueront à tous les produits cités ici.

Photos des variétés



Blue



White

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2018 Ball Horticultural Company