

Celosia Dracula

(*Celosia cristata*)

Culture Plantes Annuelles (mis à jour 10/01/18)

Plug crop time: 3 to 4 weeks

Transplant to finish: 6 to 8 weeks

- First-of-its-kind novelty celosia shows one big flower atop the plant.
- In the greenhouse, flower is red and foliage is green with some red. Outdoors, foliage is darker and more purple-toned and flower is darker purple.
- Unusual shape and eye-catching colour add drama to landscapes, gardens and containers.
- Good mid-height border plant.

NOTE: Shorter growth in high light.

Informations générales

Exposition	Période de floraison	Hauteur	Largeur	Distance de plantation
Soleil	Printemps, Fin du printemps, Été, Fin de l'été	8-16 in. (20-41 cm)	8-12 in. (20-30 cm)	6-10 in. (15-25 cm)

Germination

Type de semence	Taille de de mottes recommandée	Graines/alvéole	Durée de culture du jeune plant (en semaines)	Jours jusqu'à la germination	pH/EC du substrat de semis	Couvrir le semis
COT	288	1	3-4	2-4	5,8-6,2 pH 0,7-1,2 mmhos/cm	Couverture légère

Production du jeune plant

	Stade 1	Stade 2	Stade 3	Stade 4
Humidité du substrat	Niveau 4	Niveau 4	Niveau 3-4	Niveau 3-4
Températures	68-72°F 20-22°C	68-72°F 20-22°C	68-72°F 20-22°C	68-72°F 20-22°C
Lumière	Lumière	1 500-2 500 f.c. (16 100-26 900 Lux)	1 500-2 500 f.c. (16 100-26 900 Lux)	2 500-5 000 f.c. (26 900-53 800 Lux)
Fertilisation		Inférieur à 100 ppm de N - Moins de 0,7 EC	100 à 175 ppm de N - 0,7 à 1,2 EC	100 à 175 ppm de N - 0,7 à 1,2 EC

Conseils pour la multiplication

Maintenir le substrat constamment humide ; ne pas le laisser dessécher. Celosia Dracula peut être sensible à la longueur de jour à un stade très précoce. Il est recommandé de semer et de cultiver les jeunes plants avec 11 à 14 heures de longueur de jour. Une période de 3 à 4 semaines avec 12 à 14 heures de traitement LIP après semis (au stade plantule) sera optimale pour accélérer la floraison et réduire le manque d'homogénéité et la déformation des fleurs si la production se fait en longueurs de jours défavorables.

Culture de la plante finie

Culture de la plante finie : températures	pH/EC substrat de culture	Fertilisation	Longueur du jour
(jour) 65-72°F 18-22°C (nuit) 59-65°F 15-18°C	5,8-6,2 pH 1,0-1,5 mmhos/cm	100 à 175 ppm de N - 0,7 à 1,2 EC	-

Planning de culture

Taille du pot	Plantes/pot	Durée de culture	Saison	Régulateurs de croissance
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	6-9 (semaines)	Printemps	-

Recommandations de fertilisation

La célosie est sensible à une forte salinité.

Sensibilité aux produits phytosanitaires

Si nécessaire, on peut choisir entre deux traitements avec des régulateurs : 1. Il est possible d'utiliser du paclobutrazol (Bonzi, Piccolo, Piccolo 10x) 3 à 5 ppm (0,75 à 1,25 ml/l, formulation à 0,4 %) en pulvérisation au stade émergence des racines (stade 1) pour contrôler l'étiollement précoce des hypocotyles. Ce traitement peut retarder la floraison de 7 à 10 jours. 2. Ce traitement n'est pas nécessaire si le traitement 1 a déjà été effectué. Ce traitement optionnel est une pulvérisation précoce au stade 3 de daminozide (B-Nine, Alar, Dazide) à la dose de 1 500 à 2 500 ppm. Ce traitement ne sera pas aussi fort que le paclobutrazol pour contrôler l'étiollement des hypocotyles, mais il ne pourra sans doute pas retarder le moment de floraison.

Problèmes courants

Insectes : Thrips

Conseils de culture pour la plante finie

Floraison optimale avec des jours de 12 à 14 heures.

NOTE : Les producteurs doivent utiliser les informations présentées ici uniquement comme des recommandations. PanAmerican Seed conseille aux producteurs de faire un essai avec les produits dans leurs propres conditions individuelles. Les durées de culture varie en fonction du climat, du lieu, du moment de l'année, et des conditions environnementales sous serre. Il incombe au producteur de lire et de suivre toutes les instructions figurant sur l'étiquette concernant les produits. Rien dans le présent document ne doit être considéré comme une garantie d'aucune sorte de PanAmerican Seed pour les produits cités ici. Les conditions générales de vente de PanAmerican Seed s'appliqueront à tous les produits cités ici.


Photos des variétés



Dracula



Dracula



Dracula

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2018 Ball Horticultural Company