GrowerFacts

PanAmerican Seed®

Crossandra Série Tropic

(Crossandra infundibuliformis)

Culture Plantes Annuelles (mis à jour 24/02/20)

Informations générales

Exposition	Période de floraison	Hauteur	Largeur	Distance de plantation
Soleil	Fin du printemps, Été, Fin de l'été	10 in. (25 cm)	8 in. (20 cm)	8-10 in. (20-25 cm)

Germination

Type de semence	Taille de de mottes recommandée	Graines/alvéole	Durée de culture du jeune plant (en semaines)	Nombre de jours de 50% de germination à son maximum.	pH/EC (1:2) du substrat de semis	Couvrir le semis
RAW	288	1	7	7-10	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Oui

Production du jeune plant

	Stade 1	Stade 2	Stade 3	Stade 4
Humidité du substrat	Niveau 4	Niveau 3-4	Niveau 3-4	Niveau 3
Températures	78-82°F (26-28°C)	70-72°F (21-22°C)	70-72°F (21-22°C)	70-72°F (21-22°C)
Lumière	Facultatif	1 000-1 500 f.c. (10 800-16 100 Lux)	1 000-2 500 f.c. (10 800-26 900 Lux)	2 500-5 000 f.c. (26 900-53 800 Lux)
Fertilsation		Inférieur à 100 ppm de N (Moins de 0,7 EC)	100 à 175 ppm de N (0,7 à 1,2 EC)	100 à 175 ppm de N (0,7 à 1,2 EC)

Culture de la plante finie

Culture de la plante finie : températures	pH/EC (1:2) substrat de culture	Fertilsation	Longueur du jour
(jour) 75-80°F (24-27°C) **(nuit)** 68-75°F (20-24°C)	5,8-6,5 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	175 à 225 ppm de N (1,2 à 1,5 EC)	Neutre à la longueur du jour

Planning de culture

Taille du pot	Plantes/pot	Durée de culture	Saison	Régulateurs de croissance
4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	10-11 (semaines)	Printemps	-
5"/6"/1 Gallon	3 (ppp)	10-11 (semaines)	Printemps	-

Recommandations de fertilisation

Fertiliser à chaque irrigation avec 175 à 225 ppm de N avec 15-0-15 ou 15-5-15. Appliquer 20-10-20 si besoin pour favoriser le développement du feuillage. Maintenir l'EC du substrat autour de 1,2 mmhos/cm.

Problèmes courants

Insectes : Pucerons, acariens, mouches blanches Maladies : Pourriture des racines (Pythium), Rhizoctonia.

Conseils de culture pour la plante finie

Optimal sous des climats tropicaux et semi-tropicaux. Pour les régions plus fraîches (nordiques), ajouter 3 semaines à la durée de culture ou cultiver pour les ventes d'été.

NOTE: Les producteurs doivent utiliser les informations de ce document comme une ligne directrice. PanAmerican Seed recommande de toujours effectuer un essai des produits dans leurs propres conditions. Les durées de culture varient selon le climat, la situation, la saison et les conditions environnementales de la serre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la disponibilité du traitement dans sa région, ainsi que de lire et de suivre les indications mentionnées sur les étiquettes des produits qu'il utilise, en accord avec la législation en vigueur. Pour tout produit cité ici, rien ne sera considéré comme une garantie de PanAmerican Seed. Les conditions générales de vente de PanAmerican Seed s'appliquent à tous les produits énumérés dans la présente.

Photos des variétés

Flame

Yellow Splash

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road,West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2025 Ball Horticultural Company