

Cyclamen Série Dreamscape™ F₁

(*Cyclamen persicum*)

Culture Plantes Annuelles (mis à jour 24/02/20)

Informations générales

Exposition	Période de floraison	Hauteur	Largeur	Distance de plantation
Ombre, Ensoleillement partiel	Début du printemps, Fin de l'été, Automne, Hiver	6-9 in. (15-23 cm)	9-13 in. (23-33 cm)	9-15 in. (23-38 cm)

Germination

Type de semence	Taille de de mottes recommandée	Graines/alvéole	Durée de culture du jeune plant (en semaines)	Jours jusqu'à la germination	pH/EC du substrat de semis	Couvrir le semis
RAW	288 128	1 1	11-12 14	19-21	5,6-5,8 pH 0,8 mmhos/cm	Oui

Production du jeune plant

	Stade 1	Stade 2	Stade 3	Stade 4
Humidité du substrat	Niveau 4-5	Niveau 4-5	Niveau 3-4	Niveau 2-3
Températures	64°F (18°C)	62-64°F (17-18°C)	61-64°F (16-18°C)	61-64°F (16-18°C)
Lumière	Obscurité	10-15 mol·m ⁻² ·d ⁻¹		
Fertilisation	Inférieur à 100 ppm de N (Moins de 0,7 EC)	100 à 175 ppm de N (0,7 à 1,2 EC)	100 à 175 ppm de N (0,7 à 1,2 EC)	100 à 175 ppm de N (0,7 à 1,2 EC)

Conseils pour la multiplication

Il est possible de transplanter le jeune plant dans une plaque de 60-72 alvéoles et de prolonger le stade jeune plant de 6 à 7 semaines avant l'empotage. Ceci réduira la durée de culture après l'empotage et les jeunes plants pourront être cultivés dans une situation mieux maîtrisée sur une plus longue période.

Culture de la plante finie

Culture de la plante finie : températures	pH/EC substrat de culture	Fertilisation	Longueur du jour
(jour) 62-64°F (17-18°C) (nuit) 54-59°F (12-15°C)	5,6-5,8 pH 0,8-1,2 mmhos/cm	225 à 300 ppm de N (1,5 à 2,0 EC)	Neutre à la longueur du jour

Planning de culture

Taille du pot	Plantes/pot	Durée de culture	Saison	Régulateurs de croissance
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	18-20 (semaines)	Automne	-

Problèmes courants

Maladies courantes : Botrytis, Chalara, Colletotrichum, Erwinia (pourriture molle bactérienne), Fusarium oxysporum, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia, Cylindrocarpon Ravageurs courants : Pucerons, chenilles (Duponchelia), thrips, tarsonèmes communs, sciarides et mouches de rivage

Conseils de culture pour la plante finie

L'utilisation de plaques de 80-72 alvéoles réduira la durée de culture après empotage d'environ 6 à 7 semaines.

NOTE: Les producteurs doivent utiliser les informations de ce document comme une ligne directrice. PanAmerican Seed recommande de toujours effectuer un essai des produits dans leurs propres conditions. Les durées de culture varient selon le climat, la situation, la saison et les conditions environnementales de la serre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la disponibilité du traitement dans sa région, ainsi que de lire et de suivre les indications mentionnées sur les étiquettes des produits qu'il utilise, en accord avec la législation en vigueur. Pour tout produit cité ici, rien ne sera considéré comme une garantie de PanAmerican Seed. Les conditions générales de vente de PanAmerican Seed s'appliquent à tous les produits énumérés dans la présente.

Photos des variétés



Bright Red



Deep Burgundy



Deep Rose



Purple



Salmon Eye



White



Dark Flamed
Mixture



Mixture

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2021 Ball Horticultural Company