

Erysimum Série Citrona®

(*Erysimum species*)

Culture Plantes Annuelles (mis à jour 10/01/18)

Plug crop time: 4 weeks

Transplant to finish: 7 to 9 weeks

- Very floriferous, well-branched plants display bright, scented blooms in Spring and Autumn.
- No vernalization needed.
- Matches pansy production well; grow in premium packs, 4-in./10-cm pots and gallons.

Informations générales

Exposition	Période de floraison	Hauteur	Largeur	Distance de plantation
Soleil	Début du printemps, Printemps, Automne	10-12 in. (25-30 cm)	10-12 in. (25-30 cm)	10-14 in. (25-36 cm)

Germination

Type de semence	Taille de de mottes recommandée	Graines/alvéole	Durée de culture du jeune plant (en semaines)	Jours jusqu'à la germination	pH/EC du substrat de semis	Couvrir le semis
RAW	288	1	4	2-4	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Oui

Production du jeune plant

	Stade 1	Stade 2	Stade 3	Stade 4
Humidité du substrat	Niveau 4	Niveau 4	Niveau 4-3	Niveau 4-2
Températures	68-72°F 20-22°C	65-70°F 18-21°C	60-65°F 16-18°C	55-60°F 13-16°C
Lumière	Facultatif	2 500-3 000 f.c. (26 900-32 300 Lux)	2 500-3 000 f.c. (26 900-32 300 Lux)	2 500-3 000 f.c. (26 900-32 300 Lux)
Fertilisation	Inférieur à 100 ppm de N - Moins de 0,7 EC			100 à 175 ppm de N - 0,7 à 1,2 EC
Régulateurs de croissance	paclobutrazol/10 ppm/Pulvérisation			

Culture de la plante finie

Culture de la plante finie : températures	pH/EC substrat de culture	Fertilisation	Longueur du jour
(jour) 65-70°F/18-21°C (nuit) 55-60°F/13-16°C	5,8-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	225 à 300 ppm de N - 1,5 à 2,0 EC	Jour long facultatif

Planning de culture

Taille du pot	Plantes/pot	Durée de culture	Saison	Régulateurs de croissance
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	7-8 (semaines)	Début du printemps	mélange de daminozide / chlorure de chlorméquat 2 500/1 000 ppm Pulvérisation
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	5 (semaines)	Automne	paclobutrazol 20 ppm Pulvérisation

Conseils de culture pour la plante finie

Erysimum obtient de meilleures performances s'il est cultivé à des températures fraîches.

NOTE : Les producteurs doivent utiliser les informations présentées ici uniquement comme des recommandations. PanAmerican Seed conseille aux producteurs de faire un essai avec les produits dans leurs propres conditions individuelles. Les durées de culture varie en fonction du climat, du lieu, du moment de l'année, et des conditions environnementales sous serre. Il incombe au producteur de lire et de suivre toutes les instructions figurant sur l'étiquette concernant les produits. Rien dans le présent document ne doit être considéré comme une garantie d'aucune sorte de PanAmerican Seed pour les produits cités ici. Les conditions générales de vente de PanAmerican Seed s'appliqueront à tous les produits cités ici.

Photos des variétés



Orange



Yellow

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2018 Ball Horticultural Company