

Helichrysum Silver Mist

(*Helichrysum microphyllum* (*Plectostachys serphyllifolia*))

Culture Plantes Annuelles (mis à jour 10/01/18)

Plug crop time: 6 to 7 weeks

Transplant to finish: 8 to 9 weeks

- Accent plant for mixed containers and landscapes, as well as an indoor plant.
- Full, mounded and spreading plants branch well without pinching.
- Silver colour intensifies with more light; under lower light, foliage appears more green.

Informations générales

Exposition	Période de floraison	Hauteur	Largeur	Distance de plantation
Soleil	-	6-8 in. (15-20 cm)	18-24 in. (46-61 cm)	18-26 in. (46-66 cm)

Germination

Type de semence	Taille de de mottes recommandée	Graines/alvéole	Durée de culture du jeune plant (en semaines)	Jours jusqu'à la germination	pH/EC du substrat de semis	Couvrir le semis
MPL	288	1	6-7	6-8	5,5-6,3 pH 0,75 mmhos/cm	Non

Production du jeune plant

	Stade 1	Stade 2	Stade 3	Stade 4
Humidité du substrat	Niveau 4	Niveau 3-4	Niveau 3-4	Niveau 3
Températures	72-76°F 22-24°C	65-72°F 18-22°C	65-70°F 18-21°C	62-65°F 17-18°C
Lumière	Facultatif	1 000-2 500 f.c. (10 800-26 900 Lux)	1 000-2 500 f.c. (10 800-26 900 Lux)	2 500-5 000 f.c. (26 900-53 800 Lux)
Fertilisation		Inférieur à 100 ppm de N - Moins de 0,7 EC	100 à 175 ppm de N - 0,7 à 1,2 EC	100 à 175 ppm de N - 0,7 à 1,2 EC

Conseils pour la multiplication

Ne pas trop arroser. Éviter d'arroser les plants tard dans la journée, car un feuillage constamment humide peut les rendre sensibles au Botrytis. Ne nécessite pas de pincement.

Culture de la plante finie

Culture de la plante finie : températures	pH/EC substrat de culture	Fertilisation	Longueur du jour
(jour) 65-75°F/18-24°C (nuit) 62-65°F/17-18°C	5,5-6,5 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	225 à 300 ppm de N - 1,5 à 2,0 EC	-

Planning de culture

Taille du pot	Plantes/pot	Durée de culture	Saison	Régulateurs de croissance
Plaque 306	1 (ppp)	8-9 (semaines)	Printemps	-
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	8-9 (semaines)	Printemps	-
5"/6"/1 Gallon	3 (ppp)	9-10 (semaines)	Printemps	-

Conseils de culture pour la plante finie

Ne pas trop arroser et éviter d'arroser les plants tard dans la journée, car un feuillage constamment humide peut les rendre sensibles à la pourriture grise. Ne nécessite pas de pincement.

NOTE : Les producteurs doivent utiliser les informations présentées ici uniquement comme des recommandations. PanAmerican Seed conseille aux producteurs de faire un essai avec les produits dans leurs propres conditions individuelles. Les durées de culture varie en fonction du climat, du lieu, du moment de l'année, et des conditions environnementales sous serre. Il incombe au producteur de lire et de suivre toutes les instructions figurant sur l'étiquette concernant les produits. Rien dans le présent document ne doit être considéré comme une garantie d'aucune sorte de PanAmerican Seed pour les produits cités ici. Les conditions générales de vente de PanAmerican Seed s'appliqueront à tous les produits cités ici.

Photos des variétés



Silver Mist



Silver Mist



Silver Mist

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2018 Ball Horticultural Company