

## ColorGrass® Juncus Javelin

(*Juncus pallidus*)

Culture Plantes Annuelles (mis à jour 10/01/18)

**Plug crop time:** 5 to 6 weeks

**Transplant to finish:** 5 to 6 weeks

Developed from unique genetics and available only from PanAmerican Seed, Javelin makes a dramatic “thriller” for mixed containers. Can grow up to 5 ft./1.5 m tall in gardens/landscapes. Rugged, upright plant can grow in standing water, but also handles heat/drought. Provides great Winter interest, maintaining upright, stiff, straw-colour foliage.

### Informations générales

Exposition	Période de floraison	Hauteur	Largeur	Distance de plantation
Soleil	-	48 in. (122 cm)	18-20 in. (46-51 cm)	18-22 in. (46-56 cm)

### Germination

Type de semence	Taille de de mottes recommandée	Graines/alvéole	Durée de culture du jeune plant (en semaines)	Jours jusqu'à la germination	pH/EC du substrat de semis	Couvrir le semis
MPL	288	1	5-6	5-6	5,5-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Non

### Production du jeune plant

	Stade 1	Stade 2	Stade 3	Stade 4
<b>Humidité du substrat</b>	Niveau 4	Niveau 3-4	Niveau 2-3	Niveau 2-3
<b>Températures</b>	71-76°F 22-24°C	64-70°F 18-21°C	64-68°F 18-20°C	64-66°F 18-19°C
<b>Lumière</b>	Lumière	1 000-2 500 f.c. (10 800-26 900 Lux)	1 000-2 500 f.c. (10 800-26 900 Lux)	2 500-5 000 f.c. (26 900-53 800 Lux)
<b>Fertilisation</b>		Inférieur à 100 ppm de N - Moins de 0,7 EC	100 à 175 ppm de N - 0,7 à 1,2 EC	100 à 175 ppm de N - 0,7 à 1,2 EC

### Recommandations de fertilisation

Utiliser un engrais à base de nitrate peu dosé en phosphore.

### Conseils pour la multiplication

Pour éviter un feuillage recourbé, on peut utiliser Bonzi à 30 ppm en pulvérisation.

### Culture de la plante finie

Culture de la plante finie : températures	pH/EC substrat de culture	Fertilisation	Longueur du jour
(jour) 62-74°F/17-23°C (nuit) 59-64°F/15-18°C	5,5-6,2 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	175 à 225 ppm de N - 1,2 à 1,5 EC	Neutre à la longueur du jour

### Planning de culture

Taille du pot	Plantes/pot	Durée de culture	Saison	Régulateurs de croissance
Plaque 306	1 (ppp)	5-6 (semaines)	Printemps	-
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	5-6 (semaines)	Printemps	-
5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	6-7 (semaines)	Printemps	-

## Recommandations de fertilisation

Utiliser un engrais à base de nitrate peu dosé en phosphore ; éviter l'excès d'ammoniaque, l'engrais azoté et l'excès d'engrais, cela risquerait de faire des plants moins érigés.

## Problèmes courants

Plantation trop profonde des mini-mottes.

## Conseils de culture pour la plante finie

Pour éviter un feuillage recourbé, on peut utiliser Bonzi à 30 ppm en pulvérisation.

**NOTE :** Les producteurs doivent utiliser les informations présentées ici uniquement comme des recommandations. PanAmerican Seed conseille aux producteurs de faire un essai avec les produits dans leurs propres conditions individuelles. Les durées de culture varie en fonction du climat, du lieu, du moment de l'année, et des conditions environnementales sous serre. Il incombe au producteur de lire et de suivre toutes les instructions figurant sur l'étiquette concernant les produits. Rien dans le présent document ne doit être considéré comme une garantie d'aucune sorte de PanAmerican Seed pour les produits cités ici. Les conditions générales de vente de PanAmerican Seed s'appliqueront à tous les produits cités ici.

## Photos des variétés

---



Javelin

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2018 Ball Horticultural Company