

Gomphrena Fireworks

(*Gomphrena pulchella*)

Culture Plantes Annuelles (mis à jour 14/08/19)

Informations générales

Exposition	Période de floraison	Hauteur	Largeur	Distance de plantation
Soleil	Fin du printemps, Été, Automne	48 in. (122 cm)	48 in. (122 cm)	20-36 in. (51-91 cm)

Germination

Type de semence	Taille de de mottes recommandée	Graines/alvéole	Durée de culture du jeune plant (en semaines)	Jours jusqu'à la germination	pH/EC du substrat de semis	Couvrir le semis
COT	406	1	5-6	2-3	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Oui

Production du jeune plant

	Stade 1	Stade 2	Stade 3	Stade 4
Humidité du substrat	Niveau 4	Niveau 3-4	Niveau 2-3	Niveau 2-3
Températures	68-75°F (20-24° C)	68-72°F (20-22°C)	68-72°F (20-22°C)	64-68°F (18-20°C)
Lumière	Lumière	1 000-2 500 f.c. (10 800-26 900 Lux)	2 500-5 000 f.c. (26 900-53 800 Lux)	2 500-5 000 f.c. (26 900-53 800 Lux)
Fertilisation		Inférieur à 100 ppm de N - Moins de 0,7 EC	100 à 175 ppm de N - 0,7 à 1,2 EC	100 à 175 ppm de N - 0,7 à 1,2 EC

Conseils pour la multiplication

Si nécessaire, les jeunes plants sont sensibles au daminozide.

Culture de la plante finie

Culture de la plante finie : températures	pH/EC substrat de culture	Fertilisation	Longueur du jour
(jour) 65-75°F (18-24°C) (nuit) 63-66°F (17-19°C)	5,8-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	225 à 300 ppm de N - 1,5 à 2,0 EC	Neutre à la longueur du jour

Planning de culture


Taille du pot	Plantes/pot	Durée de culture	Saison	Régulateurs de croissance
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	8-9 (semaines)	Printemps	paclobutrazol 4-10 ppm Arrosage
5"/6"/1 Gallon	2-3 (ppp)	8-9 (semaines)	Printemps	paclobutrazol 4-10 ppm Arrosage

Conseils de culture pour la plante finie

Peut se cultiver à des températures inférieures (50 °F/10 °C minimum) avec 2 à 3 semaines supplémentaires de culture. Une luminosité élevée, un espacement des plants et des températures plus fraîches permettront de réduire l'étiollement. Un arrosage de paclobutrazol à 4-10 ppm, 2 à 3 semaines après repiquage, est généralement efficace pour contrôler l'étiollement. Des pulvérisations de paclobutrazol peuvent suivre l'arrosage afin de maintenir la structure de la plante.

NOTE: Les producteurs doivent utiliser les informations de ce document comme une ligne directrice. PanAmerican Seed recommande de toujours effectuer un essai des produits dans leurs propres conditions. Les durées de culture varient selon le climat, la situation, la saison et les conditions environnementales de la serre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la disponibilité du traitement dans sa région, ainsi que de lire et de suivre les indications mentionnées sur les étiquettes des produits qu'il utilise, en accord avec la législation en vigueur. Pour tout produit cité ici, rien ne sera considéré comme une garantie de PanAmerican Seed. Les conditions générales de vente de PanAmerican Seed s'appliquent à tous les produits énumérés dans la présente.


Photos des variétés




Fireworks



Fireworks



Fireworks



Fireworks

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2020 Ball Horticultural Company