

Zinnia Série Double Zahara™

(Zinnia marylandica)

Culture Plantes Annuelles (mis à jour 22/10/19)

Informations générales

| Exposition | Période de floraison | Hauteur | Largeur | Distance de plantation |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Soleil | Printemps, Fin du printemps, Été, Fin de l'été, Automne | 16-20 in. (41-51 cm) | 16-20 in. (41-51 cm) | 8-10 in. (20-25 cm) |

Germination

| Type de semence | Taille de de mottes recommandée | Graines/alvéole | Durée de culture du jeune plant (en semaines) | Jours jusqu'à la germination | pH/EC du substrat de semis | Couvrir le semis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|---|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| COT, RAW | 288 | 1 | 3 | 2-3 | 5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm | Oui |

Production du jeune plant

| | Stade 1 | Stade 2 | Stade 3 | Stade 4 |
|----------------------------------|----------------------|--|--|---|
| Humidité du substrat | Niveau 4 | Niveau 3-4 | Niveau 3-4 | Niveau 3 |
| Températures | 68-73°F (20-23°C) | 68-76°F (20-24°C) | 68-76°F (20-24°C) | 65-70°F (18-21°C) |
| Lumière | Facultatif | 1 000-2 500 f.c. (10 800-26 900 Lux) | 1 000-2 500 f.c. (10 800-26 900 Lux) | 2 500-5 000 f.c. (26 900-53 800 Lux) |
| Fertilisation | | Inférieur à 100 ppm de N - Moins de 0,7 EC | 100 à 175 ppm de N - 0,7 à 1,2 EC | 100 à 175 ppm de N - 0,7 à 1,2 EC |
| Régulateurs de croissance | | | daminozide/1 250-2 500 ppm/Pulvérisation | |

Conseils pour la multiplication

Éviter un excès d'humidité sur les plantes et les fleurs. Surveiller la pourriture grise.

Culture de la plante finie

| Culture de la plante finie : températures | pH/EC substrat de culture | Fertilisation | Longueur du jour |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| (jour) 65-70°F (18-21°C) (nuit) 59-64°F (15-18°C) | 5,5-6,0 pH 1,2-1,5 mmhos/cm | 175 à 225 ppm de N - 1,2 à 1,5 EC | Jour court facultatif |

Planning de culture

| Taille du pot | Plantes/pot | Durée de culture | Saison | Régulateurs de croissance |
|----------------|-------------|------------------|-----------|--|
| 4"/4.5"/Quart | 1 (ppp) | 8-9 (semaines) | Printemps | daminozide 3 500-5 000 ppm Pulvérisation |
| 5"/6"/1 Gallon | 3 (ppp) | 8-9 (semaines) | Printemps | daminozide 3 500-5 000 ppm Pulvérisation |
| 4"/4.5"/Quart | 1 (ppp) | 5-6 (semaines) | Été | daminozide 3 500-5 000 ppm Pulvérisation |
| 5"/6"/1 Gallon | 3 (ppp) | 5-6 (semaines) | Été | daminozide 3 500-5 000 ppm Pulvérisation |

Recommandations de fertilisation

Éviter tout stress nutritionnel pendant la production, cela pourrait entraîner moins de fleurs doubles.

Problèmes courants

Insectes : Surveiller les pucerons en début de production, et les thrips pendant la floraison. Maladies : Éviter un niveau élevé d'humidité et de condensation sous serre, car ces conditions favorisent l'apparition de pourriture grise et d'oïdium.

Conseils de culture pour la plante finie

Les fleurs seront plus abondantes et d'une couleur plus intense si la culture se fait avec une luminosité élevée.

NOTE: Les producteurs doivent utiliser les informations de ce document comme une ligne directrice. PanAmerican Seed recommande de toujours effectuer un essai des produits dans leurs propres conditions. Les durées de culture varient selon le climat, la situation, la saison et les conditions environnementales de la serre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la disponibilité du traitement dans sa région, ainsi que de lire et de suivre les indications mentionnées sur les étiquettes des produits qu'il utilise, en accord avec la législation en vigueur. Pour tout produit cité ici, rien ne sera considéré comme une garantie de PanAmerican Seed. Les conditions générales de vente de PanAmerican Seed s'appliquent à tous les produits énumérés dans la présente.

Photos des variétés



Bright Orange



Cherry



Fire



Raspberry
Ripple



Salmon



White



Yellow
Improved



Brilliant Mixture



Mixture

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2020 Ball Horticultural Company