

Ornamental Oregano Kirigami

(*Origanum x hybrida*)

Culture Plantes Annuelles (mis à jour 26/01/21)

Informations générales

Exposition	Période de floraison	Hauteur	Largeur	Distance de plantation
Soleil	Fin du printemps, Été	8-10 in. (20-25 cm)	12-14 in. (30-36 cm)	14-18 in. (36-46 cm)

Germination

Type de semence	Taille de de mottes recommandée	Graines/alvéole	Durée de culture du jeune plant (en semaines)	Nombre de jours de 50% de germination à son maximum.	pH/EC (1:2) du substrat de semis	Couvrir le semis
RAW	288	4	5-6	4-5	5,8-6,5 pH 0,75 mmhos/cm	Non

Production du jeune plant

	Stade 1	Stade 2	Stade 3	Stade 4
Humidité du substrat	Niveau 4	Niveau 3	Niveau 3-2	Niveau 2
Températures	68-72°F (20-22° C)	65-68°F (18-20°C)	65-68°F (18-20°C)	60-65°F (16-18°C)
Lumière	Lumière	2 000-2 500 f.c. (21 500-26 900 Lux)	2 000-2 500 f.c. (21 500-26 900 Lux)	3 500-5 000 f.c. (37 700-53 800 Lux)
Fertilisation		Inférieur à 100 ppm de N (Moins de 0,7 EC)	100 à 175 ppm de N (0,7 à 1,2 EC)	100 à 175 ppm de N (0,7 à 1,2 EC)
Régulateurs de croissance			daminozide/1 000-1 500 ppm/Pulvérisation	daminozide/1 000-1 500 ppm/Pulvérisation

Conseils pour la multiplication

Ne pas planter la mini-motte trop profondément, la mettre au même niveau que le substrat. Prévoir un climat de culture actif et éviter l'humidité. Cultiver sur le côté sec.

Culture de la plante finie

Culture de la plante finie : températures	pH/EC (1:2) substrat de culture	Fertilisation	Longueur du jour
(jour) 65-68°F (18-20°C) (nuit) 60-65°F (16-18°C)	5,8-6,5 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	175 à 225 ppm de N (1,2 à 1,5 EC)	Jour long obligatoire

Recommandations longueur du jour

Longs jours nécessaires, longueur de jour critique de 14 h.

Planning de culture

Taille du pot	Plantes/pot	Durée de culture	Saison	Régulateurs de croissance
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	10-12 (semaines)	Fin du printemps	daminozide 1 500-2 000 ppm Pulvérisation
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	11-13 (semaines)	Fin du printemps	daminozide 1 500-2 000 ppm Pulvérisation
Pot de 10" ou HB/3 Gallon	3-5 (ppp)	12-13 (semaines)	Fin du printemps	daminozide 1 500-2 000 ppm Pulvérisation
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	9-10 (semaines)	Été	daminozide 1 500-2 000 ppm Pulvérisation
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	9-11 (semaines)	Été	daminozide 1 500-2 500 ppm Pulvérisation
Pot de 10" ou HB/3 Gallon	3-5 (ppp)	10-12 (semaines)	Été	daminozide 2 000-2 500 ppm Pulvérisation

Problèmes courants


Sensible à la pourriture grise, à la pourriture des tiges et du collet, en particulier dans des conditions extérieures trop humides. Choisissez pour une culture protégée (sous abri) si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une sécheresse relative en conditions d'extérieur.

Conseils de culture pour la plante finie


Nécessite un climat de culture active, cultivé sur le côté sec, avec des niveaux plus élevés de luminosité. En cas de pluies fréquentes, cultiver de préférence sous abri. Apporter une fertilisation faible à modérée et une irrigation modérée. Laisser sécher les substrats bien drainés entre les arrosages. Ne supporte pas les conditions de forte humidité, qui provoquent une pourriture de la tige et des racines. Les bractées développeront une couleur d'un pourpre plus profond si les plants sont exposés à une forte luminosité ($12 \text{ à } 15 \text{ mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{d}^{-1}$) et à des conditions de fraîcheur la nuit (en-dessous de $50 \text{ }^{\circ}\text{F}/10 \text{ }^{\circ}\text{C}$). En cas de climat sec, cultiver à l'extérieur pour obtenir des bractées d'un pourpre plus intense. Kirigami est sensible au daminozide et celui-ci doit être utilisé à de faibles concentrations avec des applications multiples pour éviter un blocage de croissance. Éviter d'utiliser du daminozide une fois que les bractées commencent à se colorer pour éviter la décoloration. Du fait de son usage polyvalent, il n'y a pas de nombre spécifique d'applications de régulateurs de croissance. Il est facile d'adapter les plants à l'aspect ou la taille de conteneur souhaités.

NOTE: Les producteurs doivent utiliser les informations de ce document comme une ligne directrice. PanAmerican Seed recommande de toujours effectuer un essai des produits dans leurs propres conditions. Les durées de culture varient selon le climat, la situation, la saison et les conditions environnementales de la serre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la disponibilité du traitement dans sa région, ainsi que de lire et de suivre les indications mentionnées sur les étiquettes des produits qu'il utilise, en accord avec la législation en vigueur. Pour tout produit cité ici, rien ne sera considéré comme une garantie de PanAmerican Seed. Les conditions générales de vente de PanAmerican Seed s'appliquent à tous les produits énumérés dans la présente.

Photos des variétés



Kirigami



Kirigami



Kirigami

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2021 Ball Horticultural Company