



# Lisianthus Série ABC™ F<sub>1</sub>

(*Eustoma grandiflorum*)

Culture Fleurs coupées (mis à jour 05/11/20)

## Informations générales

Type de culture	Utilisation	Longueur de tige	Groupe de floraison
Serre, Tunnel	Point focal	36-45 in. (91-114 cm)	3

## Germination

Type de semence	Taille de de mottes recommandée	Graines/alvéole	Durée de culture du jeune plant (en semaines)	Jours jusqu'à la germination	pH/EC (1:2) du substrat de semis	Couvrir le semis
PEL	406	1	8-10	8-12	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Couverture légère

## Production du jeune plant

	Stade 1	Stade 2	Stade 3	Stade 4
<b>Humidité du substrat</b>	Niveau 4	Niveau 3-4	Niveau 3-4	Niveau 3
<b>Températures</b>	68-72°F (20-22°C)	68-72°F (20-22°C)	65-68°F (18-20°C)	62-65°F (17-18°C)
<b>Lumière</b>		1 000-2 500 f.c. (10 800-26 900 Lux)	1 000-2 500 f.c. (10 800-26 900 Lux)	2 500-5 000 f.c. (26 900-53 800 Lux)
<b>Fertilisation</b>	Inférieur à 100 ppm de N (Moins de 0,7 EC)	100 à 175 ppm de N (0,7 à 1,2 EC)	100 à 175 ppm de N (0,7 à 1,2 EC)	175 à 225 ppm de N (1,2 à 1,5 EC)

## Conseils pour la multiplication

Éviter une température élevée du substrat (>72 °F/22 °C) en commençant au stade 2, car cela peut provoquer une formation de rosettes sur la plantule, ce qui entraînera un blocage de croissance lorsque les jeunes plants seront repiqués. De même, il est essentiel d'effectuer un traitement préventif contre les maladies et les insectes pour la production de lisianthus.

## Culture de la plante finie

pH/EC (1:2) substrat de culture	Fertilisation	Longueur du jour
5,8-6,5 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	100 à 175 ppm de N (0,7 à 1,2 EC)	Jour long facultatif

## Recommandations longueur du jour

Pendant l'hiver, lorsque la longueur de jour est inférieure à 12 heures, un éclairage supplémentaire (incandescence ou HID) peut être utilisé. En jour long (plus de 14 heures) ou une interruption de la nuit de 22 h à 2 h du matin accélérera la floraison. La lumière HID est préférable car elle améliore la qualité des fleurs et réduit la durée de culture.

## Planning de culture

Type de culture	Tuteurage	Températures	Densité	Durée de culture
Serre	Recommandé	18-27°C/65-80°F (day) 13-16°C/55-60°F (night)	6-8 plantes/pi <sup>2</sup> (65-86 plantes/m <sup>2</sup> )	13-16 semaines
Tunnel	Recommandé	18-27°C/65-80°F (day) 13-16°C/55-60°F (night)	6-8 plantes/pi <sup>2</sup> (65-86 plantes/m <sup>2</sup> )	13-16 semaines

## Problèmes courants

Insectes : Pucerons, mineuses, thrips, mouches blanches Maladies : Botrytis, Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Tospovirus Autres : Algues à la surface des plateaux, formation de rosettes

## Conseils de culture pour la plante finie

En général, la durée de production du repiquage à la récolte pour la série ABC sera de 16 semaines pour les variétés appartenant au groupe de saisonnalité numéro 1, cultivées en jours courts, à 13 semaines pour celles du groupe de saisonnalité numéro 4 cultivées en jours longs. Se référer au Guide de Numéro de Saisonnalité (Seasonality Number Guide) pour le lisianthus ABC dans le catalogue Semences PanAmerican. La durée de production dépend de la période de l'année, de la température, de la longueur de jour et de l'intensité lumineuse, ainsi que de l'éclairage supplémentaire et des conditions sous serre.

## Récolte

Récolter lorsque la première fleur est complètement ouverte.

## Post récolte

Hydrater les fleurs avec une solution d'hydratation pour fleurs coupées, pendant une heure à température ambiante. Stocker au frais à 2-5 °C (36 à 41 °F) dans une solution commerciale de conditionnement pour fleurs coupées, aux doses recommandées par le fabricant.

## Tenue en vase

10 à 14 jours

**NOTE:** Les producteurs doivent utiliser les informations de ce document comme une ligne directrice. PanAmerican Seed recommande de toujours effectuer un essai des produits dans leurs propres conditions. Les durées de culture varient selon le climat, la situation, la saison et les conditions environnementales de la serre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la disponibilité du traitement dans sa région, ainsi que de lire et de suivre les indications mentionnées sur les étiquettes des produits qu'il utilise, en accord avec la législation en vigueur. Pour tout produit cité ici, rien ne sera considéré comme une garantie de PanAmerican Seed. Les conditions générales de vente de PanAmerican Seed s'appliquent à tous les produits énumérés dans la présente.

## Photos des variétés



1 Deep Rose



1 Green



1 Misty Blue



1 Purple




1 Rose Rim



1 White



1 Yellow



2 Blue




2 Blue Rim



2 Lavender



2 Misty Blue



2 Misty Pink



2 Purple



2 Rose



2 Yellow



3 Purple



3 Rose



3 White



**BloomStudios**  
WITH PANAMERICAN SEED™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
[info@bloomstudios.com](mailto:info@bloomstudios.com)

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2021 Ball Horticultural Company