

## Lavandula Lavance Deep Purple

(*Lavandula angustifolia*)

Culture Vivaces (mis à jour 20/01/21)

### Informations générales

| Exposition | Période de floraison                | Hauteur                 | Largeur                 | Distance de plantation |
|------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Soleil     | Fin du printemps, Été, Fin de l'été | 10-12 in.<br>(25-30 cm) | 10-12 in.<br>(25-30 cm) | 12 in.<br>(30 cm)      |

### Germination

| Type de semence | Taille de de mottes recommandée | Graines/alvéole | Durée de culture du jeune plant (en semaines) | Nombre de jours de 50% de germination à son maximum. | pH/EC (1:2) du substrat de semis | Couvrir le semis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|---|--|----------------------------------|------------------|
| PRM             | 288<br>128*                     | 4<br>6          | 6-8<br>8-9                                    | 4-5  | 5,8-6,5 pH<br>0,7-1,2 mmhos/cm   | Oui              |

\* Taille de mottes recommandée pour le forçage

### Production du jeune plant

|                             | Stade 1              | Stade 2                                 | Stade 3                                 | Stade 4                                 |
|-----------------------------|----------------------|---|---|---|
| <b>Humidité du substrat</b> | Niveau 4             | Niveau 3                                | Niveau 2-3                              | Niveau 2                                |
| <b>Températures</b>         | 65-68°F<br>(18-20°C) | 65-68°F<br>(18-20°C)                    | 60-65°F<br>(16-18°C)                    | 60-65°F<br>(16-18°C)                    |
| <b>Lumière</b>              |                      | 2 000-2 500 f.c.<br>(21 500-26 900 Lux) | 2 500-3 500 f.c.<br>(26 900-37 700 Lux) | 4 000-5 000 f.c.<br>(43 100-53 800 Lux) |
| <b>Fertilisation</b>        |                      | 100 à 175 ppm de N<br>(0,7 à 1,2 EC)    | 175 à 225 ppm de N<br>(1,2 à 1,5 EC)    | 175 à 225 ppm de N<br>(1,2 à 1,5 EC)    |

### Vernalisation / Période de froid

Non

### Conseils pour la multiplication

Info pour le forçage : voir Perennials Forcing Guide (Guide de Forçage Vivaces). Pour les infos calendrier : voir Lavander scheduling tool. Pulvériser un fongicide contre la fonte des semis. Prévoir une bonne ventilation et une respiration active dans la production des jeunes plants. Cultiver sur le côté sec, en arrosant tôt le matin, pour permettre aux plants de sécher pendant la journée. En cas de faible respiration et de fertilisation trop basse, *Lavandula angustifolia* peut présenter des « taches noires » sur les cotylédons, provoquées par des dégâts au niveau des racines. Ceci est réversible si la ventilation est améliorée et la fertilisation renforcée.

### Culture de la plante finie

| Culture de la plante finie : températures            | pH/EC (1:2) substrat de culture | Fertilisation                        | Longueur du jour      |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| (jour) 60-72°F (16-22°C)<br>(nuit) 60-65°F (16-18°C) | 5,8-6,5 pH<br>1,1-1,4 mmhos/cm  | 100 à 175 ppm de N<br>(0,7 à 1,2 EC) | Jour long obligatoire |

### Recommandations longueur du jour

Longueur de jour critique : 14 heures Voir Lavender Scheduling Tool sur panamseed.com pour les calendriers de production par région.

## Planning de culture

| Type de culture  | Taille du pot  | Plantes/pot | Durée de culture | Saison                            | Régulateurs de croissance                |
|------------------|----------------|-------------|------------------|-----------------------------------|--|
| Annuelle         | 4"/4.5"/Quart  | 1 (ppp)     | 9-11 (semaines)  | Été, TMJ 65°F (18°C)              | daminozide 2 000-3 000 ppm Pulvérisation |
| Annuelle         | 4"/4.5"/Quart  | 1 (ppp)     | 10-11 (semaines) | Automne, TMJ 65°F (18°C)          | daminozide 2 000-3 000 ppm Pulvérisation |
| Culture hivernée | 4"/4.5"/Quart  | 1-3 (ppp)   | 30-38 (semaines) | Fin du printemps, TMJ 60°F (16°C) | daminozide 2 000-3 000 ppm Pulvérisation |
| Annuelle         | 5"/6"/1 Gallon | 1-3 (ppp)   | 10-12 (semaines) | Automne, TMJ 65°F (18°C)          | daminozide 2 000-3 000 ppm Pulvérisation |
| Culture hivernée | 5"/6"/1 Gallon | 1-3 (ppp)   | 30-38 (semaines) | Fin du printemps, TMJ 60°F (16°C) | daminozide 2 000-3 000 ppm Pulvérisation |
| Annuelle         | 5"/6"/1 Gallon | 1-3 (ppp)   | 10-11 (semaines) | Été, TMJ 65°F (18°C)              | daminozide 2 000-3 000 ppm Pulvérisation |

### Recommandations de fertilisation

Apporter de l'engrais constant de type 1 à 2 (100 à 125 ppm de N/ 0,7 à 1,2 mmhos/cm EC ou 150 ppm si besoin).

### Problèmes courants

Nécessite un climat actif, avec un bon flux d'air, une faible humidité relative de l'air et une sécheresse relative. Le drainage du sol doit être excellent, ainsi que celui du contenant. Sujet aux maladies fongiques (taches foliaires, pourriture grise) si l'humidité relative est élevée, et s'il y a peu de flux d'air et une faible luminosité. Les plants de lavande doivent être secs avant d'être expédiés. Pas d'arrosage par le dessus pendant le transport, ni en magasin. Pour une production d'été en jours longs, essayer Lavance Deep Purple, qui est plus vigoureuse et a des coloris plus intenses pendant les longues journées d'été lumineuses.

### Conseils de culture pour la plante finie

Ne pas planter les mini-mottes trop profondément. Laisser la surface de la mini-motte au niveau de la surface du substrat. Cultiver avec une faible humidité relative et une forte luminosité. Laisser le dessus du sol sécher entre les arrosages, mais ne pas laisser le substrat se dessécher car une EC élevée pourrait endommager les racines. Surveiller la pourriture grise, la pourriture des racines, les taches foliaires, les pucerons et les acariens. Pour le transport, maintenir le substrat humide et le plant sec. Lavance est une variété optimale pour la production estivale, avec une culture optimale. Ne pas planter en début de saison. La croissance est retardée en conditions de fraîcheur. Utilisez Ellagance Purple pour la saison précoce des annuelles dans le SouthEast et Avignon Early Blue pour la saison précoce des annuelles dans le SouthWest et NorthWest. Voir Lavender Scheduling Tool à panamseed.com pour les calendriers de production par région. Pour une production hivernée, couper juste en-dessous du feuillage ; faire ceci mi-automne, environ 4 semaines avant la période de dormance, ou au printemps juste avant la repousse.

**NOTE:** Les producteurs doivent utiliser les informations de ce document comme une ligne directrice. PanAmerican Seed recommande de toujours effectuer un essai des produits dans leurs propres conditions. Les durées de culture varient selon le climat, la situation, la saison et les conditions environnementales de la serre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la disponibilité du traitement dans sa région, ainsi que de lire et de suivre les indications mentionnées sur les étiquettes des produits qu'il utilise, en accord avec la législation en vigueur. Pour tout produit cité ici, rien ne sera considéré comme une garantie de PanAmerican Seed. Les conditions générales de vente de PanAmerican Seed s'appliquent à tous les produits énumérés dans la présente.

## Photos des variétés



Lavance Deep  
Purple



Lavance Deep  
Purple

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2021 Ball Horticultural Company