

## Leucanthemum White Lion F<sub>1</sub>

(*Leucanthemum x superbum*)

Culture Vivaces (mis à jour 20/01/21)

### Informations générales

Exposition	Période de floraison	Hauteur	Largeur	Distance de plantation
Soleil	Début du printemps, Printemps, Fin du printemps, Été, Fin de l'été	8-10 in. (20-25 cm)	8-12 in. (20-30 cm)	12 in. (30 cm)

### Germination

Type de semence	Taille de de mottes recommandée	Graines/alvéole	Durée de culture du jeune plant (en semaines)	Nombre de jours de 50% de germination à son maximum.	pH/EC (1:2) du substrat de semis	Couvrir le semis
RAW	288 72	1 4	6-7 7-8	4-10	5,5-6,2 pH 0,2-0,5 mmhos/cm	Facultatif

### Production du jeune plant

	Stade 1	Stade 2	Stade 3	Stade 4
<b>Humidité du substrat</b>	Niveau 4	Niveau 3-4	Niveau 2-3	Niveau 2-3
<b>Températures</b>	68-77°F (20-25°C)	65-68°F (18-20°C)	65-68°F (18-20°C)	60-65°F (16-18°C)
<b>Lumière</b>	Facultatif	3 000-5 000 f.c. (32 300-53 800 Lux)	5 000-7 000 f.c. (53 800-75 300 Lux)	5 000-7 000 f.c. (53 800-75 300 Lux)
<b>Fertilisation</b>		Inférieur à 100 ppm de N (Moins de 0,7 EC)	100 à 175 ppm de N (0,7 à 1,2 EC)	100 à 175 ppm de N (0,7 à 1,2 EC)

### Vernalisation / Période de froid

Non

### Stade juvénile

Environ 10 feuilles vraies.

### Recommandations de fertilisation

Utiliser un engrais bien équilibré à base de nitrate de calcium. Ne pas apporter d'engrais en continu pour éviter une trop forte salinité. Il est préférable de lessiver à l'eau fraîche de temps à autre.

### Conseils pour la multiplication

Éviter une forte teneur en sels minéraux solubles. Prévoir une atmosphère dynamique, comprenant un mouvement d'air et une luminosité relativement importante. Ne pas cultiver sur une trop longue durée, car les mottes anciennes se développent irrégulièrement après empotage.

### Culture de la plante finie

Culture de la plante finie : températures	pH/EC (1:2) substrat de culture	Fertilisation	Longueur du jour
(jour) 65-72°F (18-22°C) (nuit) 57-60°F (14-16°C)	5,5-6,2 pH 0,9-1,1 mmhos/cm	100 à 175 ppm de N (0,7 à 1,2 EC)	Jour long facultatif

### Recommandations longueur du jour

Plante de jours longs facultative mais très peu sensible à la longueur de jour, avec une longueur de jour critique de 10 heures.

## Planning de culture

Type de culture	Taille du pot	Plantes/pot	Durée de culture	Saison	Régulateurs de croissance
Culture hivernée	4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	18-19 (semaines)	Début du printemps, TMJ 65°F (18°C)	-
Annuelle	4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	9-10 (semaines)	Printemps, TMJ 68°F (20°C)	daminozide 2 500 ppm Pulvérisation
Culture hivernée	5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	18-19 (semaines)	Début du printemps, TMJ 65°F (18°C)	-
Annuelle	5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	10-11 (semaines)	Printemps, TMJ 68°F (20°C)	daminozide 2 500 ppm Pulvérisation

### Recommandations de fertilisation

Utiliser un engrais bien équilibré à base de nitrate de calcium. Dose d'engrais 140 à 160 ppm. Ne pas utiliser d'engrais en continu pour éviter une trop forte salinité. Il est préférable de lessiver à l'eau fraîche de temps à autre.

### Sensibilité aux produits phytosanitaires

Ne pas utiliser de l'abamectine (nom commercial Avid/Vertimec) ou lui permettre d'être en contact (même le gaz d'un compartiment voisin). Cela détruirait la culture.

### Problèmes courants

Des mottes anciennes ou une forte salinité peuvent entraîner une croissance irrégulière.

### Recommandations de culture pour plants bien ramifiés


Cultiver à la température recommandée. Produire pour les ventes de début de printemps lorsque la longueur de jour est courte. Pour une production annuelle, on peut prévoir un paramétrage avec une pulvérisation de 300 ppm au stade jeune plant afin de favoriser la ramification.

### Conseils de culture pour la plante finie

Pour des conteneurs de 7,5 litres, utiliser 3 ou 4 mini-mottes par pot.

**NOTE:** Les producteurs doivent utiliser les informations de ce document comme une ligne directrice. PanAmerican Seed recommande de toujours effectuer un essai des produits dans leurs propres conditions. Les durées de culture varient selon le climat, la situation, la saison et les conditions environnementales de la serre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la disponibilité du traitement dans sa région, ainsi que de lire et de suivre les indications mentionnées sur les étiquettes des produits qu'il utilise, en accord avec la législation en vigueur. Pour tout produit cité ici, rien ne sera considéré comme une garantie de PanAmerican Seed. Les conditions générales de vente de PanAmerican Seed s'appliquent à tous les produits énumérés dans la présente.


## Photos des variétés



White Lion



White Lion



White Lion

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2021 Ball Horticultural Company