

Primula Heritage Crème F₁

(*Primula acaulis*)

Kultur als Einjährige (geändert/angepasst 10.01.18)

Plug crop time: 5 to 6 weeks

Transplant to finish: 15 to 17 weeks

- Unique breeding delivers a natural “English Primrose” look in a professional-quality product.
- Long-flowering, mid-size blooms and deep green foliage are produced on compact, mounded plants.
- Programmable crop can be grown pot-tight in 3.5-in./9-cm programs.

Allgemeine Informationen

Standort	Blütezeitpunkt	Höhe	Breite	Pflanzenabstand
Halbschattig, Sonne	Zeitiges Frühjahr, Frühling, Herbst	5-6 in. (13-15 cm)	5-6 in. (13-15 cm)	5-6 in. (13-15 cm)

Keimung

Saatgutform	Empfohlene Jungpflanzengröße	Samen/Zelle	Kulturdauer Jungpflanzenanzucht (Wochen)	Tage bis zur Keimung	Ausgangssubstrat pH/EC-Wert	Aussaats abdecken
RAW	288	1	5-6	7-10	5,5-5,8 pH 0,75 mmhos/cm	Leichte Abdeckung

Jungpflanzenproduktion

	Entwicklungsstadium 1	Entwicklungsstadium 2	Entwicklungsstadium 3	Entwicklungsstadium 4
Substratfeuchte	Stufe 4-5	Stufe 3-4	Stufe 3-4	Stufe 3
Temperatur	64-68°F 18-20°C	60-62°F 16-17°C	66-72°F 19-22°C	64-68°F 18-20°C
Licht	Optional	1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	2.500-5.000 f.c. (26.900-53.800 Lux)
Düngung	Weniger als 100 mg/l N - EC-Wert unter 0,7.	Weniger als 100 mg/l N - EC-Wert unter 0,7.	100 bis 175 mg/l N - EC-Wert 0,7 bis 1,2	100 bis 175 mg/l N - EC-Wert 0,7 bis 1,2

Wichtige Tipps zur Vermehrung

Vermeiden Sie eine zu hohe Lichtintensität (>30.000 Lux), um Blattschäden zu vermeiden.

Produktion bis zur Verkaufsreife

Temperatursteuerung während der Kultur	Kultursubstrat pH/EC-Wert	Düngung	Tageslänge
(Tag) 55-60°F (Nacht) 50-55°F	5,5-6,2 pH 1,0-1,2 mmhos/cm	100 bis 175 mg/l N - EC-Wert 0,7 bis 1,2	Fakultativer Langtag

Kulturplanung

Topf-/Containergröße	Pflanzen/Topf	Kulturdauer	Jahreszeit	Wachstumsregulatoren
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	15-17 (Wochen)	Herbst	daminozide 2.500-5.000 ppm Spritzen

Düngeempfehlung

Geben Sie den Pflanzen eine Startdüngung mit 20-10-20 NPK, in einer Konzentration von 200 mg/l. Wenn die Pflanze für eine Kältebehandlung bereit ist, wählen Sie einen 15-0-15 Dünger, mit einer Konzentration von 50 mg/l.

Auftretende Probleme

Schädlinge: Blattläuse, Weiße Fliege, Sumpffliege Krankheiten: Botrytis auf Blüten, Phytium, Rhizoctonia

Wichtige Tipps zur Kultur von Fertigware

Senken Sie die Temperatur nach Woche 5 (wenn die Pflanze 10 ausgebildete Blätter zeigt) auf 45 bis 48 °F (7 bis 9 °C) tagsüber und 35 bis 45 °F (2° bis 7 °C) in der Nacht, um die Knospenbildung zu initiieren. Nach Woche 11 gehen Sie zurück auf die Wachstumstemperaturen, die für die Blütenentwicklung und die Treiberei notwendig sind. Für eine spätere Treiberei können die Pflanzen bei 30 bis 45 °F (5 bis 7 °C) gehalten werden. Die Dauer der weiteren Kultur in Wochen hängt davon ab, wie groß die gewünschte Pflanze sein soll. Eine große Pflanze erfordert einen längeren Zeitraum mit Nachttemperaturen von 60 bis 65 °F (16 bis 18 °C). Vom Sichtbarwerden der Knospen bis zur ersten geöffneten Blüte, dauert es je nach Temperatur 4 bis 5 Wochen.

HINWEIS: Produzenten sollten diese hier vorgestellten Informationen als Richtwerte verwenden. PanAmerican Seed empfiehlt, dass Produzenten eigene Versuche mit Produkten unter ihren individuellen Bedingungen durchführen. Die Entwicklungsdauer bis zur Verkaufsreife hängt vom Klima, dem Standort, der Jahreszeit und den Umgebungsbedingungen des Gewächshauses ab. Es liegt in der Verantwortung des jeweiligen Produzenten, alle aktuellen Hinweise auf Etiketten und Verpackungen in Bezug auf die Produkte zu lesen und zu befolgen. Nichts in diesem Dokument gilt als Gewährleistung oder Garantie von PanAmerican Seed für die hier aufgeführten Produkte. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PanAmerican Seed gelten für alle hier gelisteten Produkte.

Abbildungen Sorte



Heritage Crème



Heritage Crème

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2018 Ball Horticultural Company