

Purslane Toucan Serie

(*Portulaca oleracea*)

Kultur als Einjährige (geändert/angepasst 10.01.18)

Plug crop time: 4 to 5 weeks

Transplant to finish: 6 to 7 weeks

- Economical, reliable and programmable seed-grown purslanes for mass-market baskets and containers.
- Requires little or no PGRs, no pinching.
- Colourful buds develop into 2-in./5-cm blooms.
- Heat loving and drought tolerant.

NOTE: We recommend to sow 4 seeds per cell.

Allgemeine Informationen

Standort	Blütezeitpunkt	Höhe	Breite	Pflanzenabstand
Sonne	Spätes Frühjahr, Sommer, Spätsommer	3-4 in. (8-10 cm)	14-16 in. (36-41 cm)	12-14 in. (30-36 cm)

Keimung

Saatgutform	Empfohlene Jungpflanzengröße	Samen/Zelle	Kulturdauer Jungpflanzenanzucht (Wochen)	Tage bis zur Keimung	Ausgangssubstrat pH/EC-Wert	Aussaat abdecken
RAW	288	4	4-5	3-4	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Nein

Jungpflanzenproduktion

	Entwicklungsstadium 1	Entwicklungsstadium 2	Entwicklungsstadium 3	Entwicklungsstadium 4
Substratfeuchte	Stufe 4	Stufe 3-4	Stufe 2-4	Stufe 2-4
Temperatur	68-74°F 20-23°C	72-75°F 22-24°C	64-68°F 18-20°C	64-68°F 18-20°C
Licht	Optional	2.500 f.c. (26.900 Lux)	2.500 f.c. (26.900 Lux)	5.000 f.c. (53.800 Lux)
Düngung	Weniger als 100 mg/l N - EC-Wert unter 0,7.	Weniger als 100 mg/l N - EC-Wert unter 0,7.	100 bis 175 mg/l N - EC-Wert 0,7 bis 1,2	100 bis 175 mg/l N - EC-Wert 0,7 bis 1,2

Produktion bis zur Verkaufsreife

Temperatursteuerung während der Kultur	Kultursubstrat pH/EC-Wert	Düngung	Tageslänge
(Tag) 68-75°F/20-24°C (Nacht) 65-68°F/18-20°C	6,0-6,5 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	100 bis 175 mg/l N - EC-Wert 0,7 bis 1,2	Tagneutral

Kulturplanung

Topf-/Containergröße	Pflanzen/Topf	Kulturdauer	Jahreszeit	Wachstumsregulatoren
Multitopfplatte/Tray	1 (ppp)	8-10 (Wochen)	Frühling	-
4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	8-10 (Wochen)	Frühling	-
5"/6"/1 Gallon	2-3 (ppp)	8-10 (Wochen)	Frühling	-

Auftretende Probleme

Schädlinge: Achten Sie auf Blattlausbefall.

Wichtige Tipps zur Kultur von Fertigware


Der Einsatz von Wachstumsregulatoren ist bei einer nährstoffarmen Kultur, bei der die Pflanzen eher trocken gehalten werden und sehr gute Lichtverhältnisse vorherrschen, nicht notwendig. Falls erforderlich, spritzen Sie mit Topflor (Flurprimidol) 30 ppm (7,9 ml/l, 0,38 % Formel) eine Woche nach dem Topfen. Wiederholen Sie das Spritzen 2 Wochen später. Oder gießen Sie mit Bonzi (Paclobutrazol) in einer Konzentration von 5 ppm (1,3 ml/l, 0,4 % Formel) eine Woche nach dem Topfen.

HINWEIS: Produzenten sollten diese hier vorgestellten Informationen als Richtwerte verwenden. PanAmerican Seed empfiehlt, dass Produzenten eigene Versuche mit Produkten unter ihren individuellen Bedingungen durchführen. Die Entwicklungsdauer bis zur Verkaufsreife hängt vom Klima, dem Standort, der Jahreszeit und den Umgebungsbedingungen des Gewächshauses ab. Es liegt in der Verantwortung des jeweiligen Produzenten, alle aktuellen Hinweise auf Etiketten und Verpackungen in Bezug auf die Produkte zu lesen und zu befolgen. Nichts in diesem Dokument gilt als Gewährleistung oder Garantie von PanAmerican Seed für die hier aufgeführten Produkte. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PanAmerican Seed gelten für alle hier gelisteten Produkte.

Abbildungen Sorte



Fuchsia



Scarlet Shades

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2018 Ball Horticultural Company