

Ornamental Millet Purple Baron F₁

(*Pennisetum glaucum*)

Kultur als Einjährige (geändert/angepasst 22.02.19)

Allgemeine Informationen

Standort	Blütezeitpunkt	Höhe	Breite	Pflanzabstand
Halbschattig	Spätes Frühjahr, Sommer, Herbst	30-40 in. (76-102 cm)	10-14 in. (25-36 cm)	10-16 in. (25-41 cm)

Keimung

Saatgutform	Empfohlene Jungpflanzengröße	Samen/Zelle	Kulturdauer Jungpflanzenanzucht (Wochen)	Tage bis zur Keimung	Ausgangssubstrat pH/EC-Wert	Aussaart abdecken
RAW	128	2-3	2-3	2-3	5,5-6,3 pH 0,75 mmhos/cm	Ja

Jungpflanzenproduktion

	Entwicklungsstadium 1	Entwicklungsstadium 2	Entwicklungsstadium 3	Entwicklungsstadium 4
Substratfeuchte	Stufe 4-5	Stufe 3-4	Stufe 2-3	Stufe 2-3
Temperatur	72-78°F 22-26°C	68-72°F 20-22°C	68-72°F 20-22°C	62-65°F 17-18°C
Licht	Optional	1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	2.500-5.000 f.c. (26.900-53.800 Lux)	2.500-5.000 f.c. (26.900-53.800 Lux)
Düngung		Weniger als 100 mg/l N - EC-Wert unter 0,7.	100 bis 175 mg/l N - EC-Wert 0,7 bis 1,2	100 bis 175 mg/l N - EC-Wert 0,7 bis 1,2

Wichtige Tipps zur Vermehrung

Überständige Pflanzen oder Pflanzen, die durch Trockenheit oder Nährstoffmangel gestresst sind, werden sich nach dem Topfen nicht gut entwickeln. Das Saatgut kann auch direkt in den Endtopf ausgebracht werden, dies reduziert die Kulturdauer um 2 Wochen. Schauen Sie für weitere Details in die GrowerFacts.

Produktion bis zur Verkaufsreife

Temperatursteuerung während der Kultur	Kultursubstrat pH/EC-Wert	Düngung	Tageslänge
(Tag) 68-85°F/20-29°C (Nacht) 64-66°F/18-19°C	5,5-6,5 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	175 bis 225 mg/l N - EC-Wert 1,2 bis 1,5	-

Kulturplanung

Topf-/Containergröße	Pflanzen/Topf	Kulturdauer	Jahreszeit	Wachstumsregulatoren
5"/6"/1 Gallon	3 (ppp)	11-13 (Wochen)	Frühling	paclobutrazol 3-5 ppm Angießverfahren
5"/6"/1 Gallon	3 (ppp)	9-10 (Wochen)	Herbst	-

Wichtige Tipps zur Kultur von Fertigware

Überständige Pflanzen oder Pflanzen, die durch Trockenheit oder Nährstoffmangel gestresst sind, werden sich nicht gut entwickeln. Nicht bei Temperaturen unter 60 °F (16 °C) kultivieren. Niedrige Temperaturen können zu Chlorosen oder Nekrosen an den Blättern und zu gebogenen Blütenständen führen. Viel Licht führt zu einer besseren basalen Triebbildung und stärkeren Stielen. Wenn die Samen direkt in den Endtopf gesät werden, gießen Sie 4 Wochen nach der Aussaat mit Paclobutrazol, in einer Konzentration von 6 bis 8 mg/l, und wiederholen Sie die Anwendung nach 10 Tagen ein weiteres Mal. Werden Jungpflanzen getopft, gießen Sie mit Paclobutrazol, in einer Konzentration von 3 bis 5 mg/l, eine Woche nach dem Topfen. Die Angabe zur Kulturdauer in kleinen Töpfen basiert auf einer Tagesdurchschnittstemperatur von 68 °F (20 °C) und verkaufsreife Pflanzen ohne Blütenstand.

HINWEIS: Produzenten sollten diese hier vorgestellten Informationen als Richtwerte verwenden. PanAmerican Seed empfiehlt, dass Produzenten eigene Versuche mit Produkten unter ihren individuellen Bedingungen durchführen. Die Entwicklungsdauer bis zur Verkaufsfähigkeit hängt vom Klima, dem Standort, der Jahreszeit und den Umgebungsbedingungen des Gewächshauses ab. Es liegt in der Verantwortung des Produzenten, sich zu vergewissern, dass das Produkt in dem betreffenden Land zugelassen ist, sowie alle auf die diesbezüglichen Produkte bezogenen aktuellen Hinweise auf den Etiketten zu lesen und zu befolgen. Nichts in diesem Dokument gilt als Gewährleistung oder Garantie von PanAmerican Seed für die hier aufgeführten Produkte. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PanAmerican Seed gelten für alle hier gelisteten Produkte.

Abbildungen Sorte



Purple Baron



Purple Baron

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2019 Ball Horticultural Company