

Silene Starry Dreams

(*Silene alpestris*)

Kultur als Staude (geändert/angepasst 30.08.19)

Allgemeine Informationen

| Standort | Blütezeitpunkt | Höhe | Breite | Pflanzabstand |
|--------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Halbschattig | Sommer | 6-8 in. (15-20 cm) | 8-10 in. (20-25 cm) | 6-10 in. (15-25 cm) |

Keimung

| Saatgutform | Empfohlene Jungpflanzengröße | Samen/Zelle | Kulturdauer Jungpflanzenanzucht (Wochen) | Tage bis zur Keimung | Ausgangssubstrat pH/EC-Wert | Aussaat abdecken |
|-------------|------------------------------|-------------|--|----------------------|-----------------------------|------------------|
| RAW | 288 | 3-4 | 5-6 | 5-7 | 5,8-6,5 pH 0,75 mmhos/cm | Nein |

Jungpflanzenproduktion

| | Entwicklungsstadium 1 | Entwicklungsstadium 2 | Entwicklungsstadium 3 | Entwicklungsstadium 4 |
|------------------------|---|---|--|--|
| Substratfeuchte | Stufe 4 | Stufe 3 | Stufe 2 | Stufe 2 |
| Temperatur | 68-72°F (20-22°C) | 65-68°F (18-20°C) | 60-65°F (16-18°C) | 60-65°F (16-18°C) |
| Licht | Dunkelheit | 2.000-2.500 f.c. (21.500-26.900 Lux) | 2.000-2.500 f.c. (21.500-26.900 Lux) | 4.000-5.000 f.c. (43.100-53.800 Lux) |
| Düngung | Weniger als 100 mg/l N - EC-Wert unter 0,7. | Weniger als 100 mg/l N - EC-Wert unter 0,7. | 100 bis 175 mg/l N - EC-Wert 0,7 bis 1,2 | 100 bis 175 mg/l N - EC-Wert 0,7 bis 1,2 |

Vernalisation / Kühlperiode

Nein

Wichtige Tipps zur Vermehrung

Vermeiden Sie zu nasse Kulturbedingungen.

Produktion bis zur Verkaufsreife

| Temperatursteuerung während der Kultur | Kultursubstrat pH/EC-Wert | Düngung | Tageslänge |
|--|--------------------------------|---------|------------|
| (Tag) 65-68°F (18-20°C) (Nacht) 60-65°F (16-18°C) | 5,8-6,5 pH 1,0-1,2 mmhos/cm | | - |

Kulturplanung

| Kulturtyp | Topf-/Containergöße | Pflanzen/Topf | Kulturdauer | Jahreszeit | Wachstumsregulatoren |
|--------------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Einjährige Pflanze | 4"/4.5"/Quart | 1 (ppp) | 10-14 (Wochen) | Spätes Frühjahr | daminozide 2.000-2.500 ppm Spritzen |
| Einjährige Pflanze | 5"/6"/1 Gallon | 3-4 (ppp) | 10-14 (Wochen) | Spätes Frühjahr | daminozide 2.000-2.500 ppm Spritzen |

Wichtige Tipps zur Kultur von Fertigware

Niedrige bis mittlere Düngung ist ideal. Halten Sie das Substrat gleichmäßig feucht. Beugen Sie einem Mg- und Fe-Mangel vor. Regelmäßig auf Befall mit Blattläusen, Spinnmilben, Nackt- und Gehäuseschnecken überprüfen.

HINWEIS: Produzenten sollten diese hier vorgestellten Informationen als Richtwerte verwenden. PanAmerican Seed empfiehlt, dass Produzenten eigene Versuche mit Produkten unter ihren individuellen Bedingungen durchführen. Die Entwicklungsdauer bis zur Verkaufsreife hängt vom Klima, dem Standort, der Jahreszeit und den Umgebungsbedingungen des Gewächshauses ab. Es liegt in der Verantwortung des Produzenten, sich zu vergewissern, dass das Produkt in dem betreffenden Land zugelassen ist, sowie alle auf die diesbezüglichen Produkte bezogenen aktuellen Hinweise auf den Etiketten zu lesen und zu befolgen. Nichts in diesem Dokument gilt als Gewährleistung oder Garantie von PanAmerican Seed für die hier aufgeführten Produkte. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PanAmerican Seed gelten für alle hier gelisteten Produkte.

Abbildungen Sorte



Starry Dreams



Starry Dreams

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2020 Ball Horticultural Company