

Dahlia Serie Figaro™

(Dahlia x hybrida)

Coltivazione piante annuali (rivisto/adatto 21/06/22)

Informazioni generali

Esposizione	Periodo di fioritura	Altezza	Larghezza	Spaziare
Esposizione parziale al sole	Primavera, Fine primavera, Estate, Fine estate, Autunno	14-18 in. (36-46 cm)	10-12 in. (25-30 cm)	10-14 in. (25-36 cm)

Germinazione

Tipo di seme	Dimensioni consigliate del plug	Semi/alveolo	Durata della coltivazione in plug (settimane)	giorni dal 50% alla germinazione massima	Valori pH/CE (1:2) substrato di semina	Copertura seme
RAW	288	1	4-5	3-7	5,5-5,8 pH 0,5-0,75 mmhos/cm	Si

Produzione giovani piante

	Fase di viluppo 1	Fase di viluppo 2	Fase di viluppo 3	Fase di viluppo 4
Umidità del substrato	Livello 3	Livello 3	Livello 2-3	Livello 2-3
Temperatura	68-73°F (20-23°C)	68-73°F (20-23°C)	65-70°F (18-21°C)	65-70°F (18-21°C)
Luce		1.500-3.000 f.c. (16.100-32.300 Lux)	1.500-3.000 f.c. (16.100-32.300 Lux)	2.500-4.000 f.c. (26.900-43.100 Lux)
Fertilizzazione		Meno di 100 mg N (Meno di 0,7 CE)	da 100 a 175 mg N (0,7-1,2 CE)	da 100 a 175 mg N (0,7-1,2 CE)

Consigli per la propagazione

Nel caso si faccia uso di una cella di germinazione, trasferire i vassoi nella serra al primo segnale di germinazione.

Continuazione della coltivazione fino al prodotto finale

Temperatura fase finale della coltivazione	Valori pH/CE (1:2) substrato di coltivazione	Fertilizzazione	Lunghezza giorno
(giorno) 52-60°F (11-16°C) (notte) 52-60°F (11-16°C)	5,8-6,2 pH 0,75-1,0 mmhos/cm	da 225 a 300 mg N (1,5-2,0 CE)	Giorno lungo necessario / Longidiurne obbligate

Raccomandazione lunghezza del giorno

La lunghezza del giorno ideale per la Dahlia Figaro è tra le 12 e le 14 ore. Giorni brevi provocano la formazione di tuberi. Giorni troppo lunghi (≥16 ore) mantengono maggiormente le piante allo stadio vegetativo e ritardano l'induzione fiorale.

Programmazione della coltivazione

Dimensioni del vaso/contenitore	Piante/vaso	Durata della coltivazione	Stagione	Fitoregolatori / Regolatori di crescita
Vassoio per la semina - 306 alveoli	1 (ppp)	5-6 (settimane)	Primavera	-
4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	5-6 (settimane)	Primavera	-

Sensibilità ai prodotti fitosanitari


A-Rest, Bonzi, B-Nine/Alar e Cycocel sono indicati per il controllo delle piante.

Consigli per la coltivazione di piante finite

Risponde molto bene al trattamento con B-Nine/Alar. Anche molto sensibile alla DIF (differenza tra temperatura diurna e notturna); le piante risultano più corte se il DIF è negativo.

NOTA: Le informazioni fornite sono da intendersi come semplici linee guida per i produttori. PanAmerican Seed consiglia ai produttori di condurre una prova delle varietà nelle condizioni di coltivazione locali. La durata della coltivazione dipende da condizioni climatiche, area geografica, stagione e condizioni all'interno della serra. È responsabilità del produttore verificare se il prodotto è autorizzato nel paese in questione, oltre che leggere attentamente e rispettare le indicazioni riportate sulle etichette relative ai prodotti. Il presente documento non costituisce in alcun modo una garanzia da parte di PanAmerican Seed dei prodotti ivi elencati. Tutti i prodotti ivi elencati sono soggetti ai termini e alle condizioni di vendita di PanAmerican Seed.


Immagini delle varietà



Orange Shades



Red Shades



Violet Shades



White



Yellow Shades



Mixture



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2025 Ball Horticultural Company