

## Erysimum Serie Citrona®

(*Erysimum species*)

Coltivazione piante annuali (rivisto/adatto 10/01/18)

**Plug crop time:** 4 weeks

**Transplant to finish:** 7 to 9 weeks

- Very floriferous, well-branched plants display bright, scented blooms in Spring and Autumn.
- No vernalization needed.
- Matches pansy production well; grow in premium packs, 4-in./10-cm pots and gallons.

### Informazioni generali

Esposizione	Periodo di fioritura	Altezza	Larghezza	Spaziare
Sole	Inizio primavera, Primavera, Autunno	10-12 in. (25-30 cm)	10-12 in. (25-30 cm)	10-14 in. (25-36 cm)

### Germinazione

Tipo di seme	Dimensioni consigliate del plug	Semi/alveolo	Durata della coltivazione in plug (settimane)	Numero di giorni necessari per la germinazione	Valori pH/CE substrato di semina	Copertura seme
RAW	288	1	4	2-4	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Si

### Produzione giovani piante

	Fase di viluppo 1	Fase di viluppo 2	Fase di viluppo 3	Fase di viluppo 4
<b>Umidità del substrato</b>	Livello 4	Livello 4	Livello 4-3	Livello 4-2
<b>Temperatura</b>	68-72°F 20-22°C	65-70°F 18-21°C	60-65°F 16-18°C	55-60°F 13-16°C
<b>Luce</b>	Facoltativo	2.500-3.000 f.c. (26.900-32.300 Lux)	2.500-3.000 f.c. (26.900-32.300 Lux)	2.500-3.000 f.c. (26.900-32.300 Lux)
<b>Fertilizzazione</b>			Meno di 100 mg N - Meno di 0,7 CE	da 100 a 175 mg N - 0,7-1,2 CE
<b>Fitoregolatori / Regolatori di crescita</b>			paclobutrazol/10 ppm/Nebulizzare/Spruzzare	

### Continuazione della coltivazione fino al prodotto finale

Temperatura fase finale della coltivazione	Valori pH/CE substrato di coltivazione	Fertilizzazione	Lunghezza giorno
(giorno) 65-70°F 18-21°C (notte) 55-60°F 13-16°C	5,8-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	da 225 a 300 mg N - 1,5-2,0 CE	Giorno lungo facoltativo / Longidurne facoltative

### Programmazione della coltivazione

Dimensioni del vaso/contenitore	Piante/vaso	Durata della coltivazione	Stagione	Fitoregolatori / Regolatori di crescita
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	7-8 (settimane)	Inizio primavera	daminozide/chlormequat chloride miscela estemporanea 2.500/1.000 ppm Nebulizzare/Spruzzare
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	5 (settimane)	Autunno	paclobutrazol 20 ppm Nebulizzare/Spruzzare

## Consigli per la coltivazione di piante finite

Per risultati ottimali, si consiglia di coltivare Erysimum in condizioni di temperature fresche.

**NOTA:** Le informazioni fornite sono da intendersi come semplici linee guida per i produttori. PanAmerican Seed consiglia ai produttori di condurre una prova delle varietà nelle condizioni di coltivazione locali. La durata della coltivazione dipende da condizioni climatiche, area geografica, stagione e condizioni all'interno della serra. Il coltivatore si assume inoltre la responsabilità di leggere e rispettare le indicazioni riportate sulle etichette più recenti relative all'uso dei prodotti. Il presente documento non costituisce in alcun modo una garanzia da parte di PanAmerican Seed dei prodotti ivi elencati. Tutti i prodotti ivi elencati sono soggetti ai termini e alle condizioni di vendita di PanAmerican Seed.

## Immagini delle varietà

---



Orange



Yellow

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2018 Ball Horticultural Company