

Fuseables® Serie Petunia-Bacopa

(*Petunia hybrida*, *Sutera cordata*)

Coltivazione piante annuali (rivisto/adatto 12/01/21)

Informazioni generali

Esposizione	Periodo di fioritura	Altezza	Larghezza	Spaziare
Sole	Primavera, Fine primavera, Estate	6-12 in. (15-30 cm)	30-39 in. (76-99 cm)	10-15 in. (25-38 cm)

Germinazione

Tipo di seme	Dimensioni consigliate del plug	Semi/alveolo	Durata della coltivazione in plug (settimane)	Numero di giorni necessari per la germinazione	Valori pH/CE (1:2) substrato di semina	Copertura seme
PMPL	128 288	1	4-5	4	5,5-6,0 pH 0,75 mmhos/cm	No

Produzione giovani piante

	Fase di viluppo 1	Fase di viluppo 2	Fase di viluppo 3	Fase di viluppo 4
Umidità del substrato	Livello 5	Livello 4-5	Livello 2-4	Livello 2-4
Temperatura	72-76°F (22-24°C)	68-76°F (20-24°C)	65-70°F (18-21°C)	59-64°F (15-18°C)
Luce	Luce	1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	2.500-5.000 f.c. (26.900-53.800 Lux)
Fertilizzazione		Meno di 100 mg N (Meno di 0,7 CE)	da 100 a 175 mg N (0,7-1,2 CE)	da 100 a 175 mg N (0,7-1,2 CE)
Fitoregolatori / Regolatori di crescita			paclobutrazol/2-5 ppm/Nebulizzare/Spruzzare	

Consigli per la propagazione

Evitare il trattamento con B-Nine/Alar e Topflor per il controllo dell'altezza. Questi prodotti hanno infatti un effetto negativo sullo sviluppo di Bacopa.

Continuazione della coltivazione fino al prodotto finale

Temperatura fase finale della coltivazione	Valori pH/CE (1:2) substrato di coltivazione	Fertilizzazione	Lunghezza giorno
(giorno) 61-75°F (16-24°C) (notte) 57-65°F (14-18°C)	5,5-6,2 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	da 175 a 225 mg N (1,2-1,5 CE)	-

Programmazione della coltivazione

Dimensioni del vaso/contenitore	Piante/vaso	Durata della coltivazione	Stagione	Fitoregolatori / Regolatori di crescita
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	8-11 (settimane)	Primavera	paclobutrazol 2-4 ppm Prima annaffiatura
8"/2 Gallon	1 (ppp)	8-11 (settimane)	Primavera	paclobutrazol 2-4 ppm Prima annaffiatura
in vasi da 10" o HB/3 Gallon	1-3 (ppp)	10-12 (settimane)	Primavera	paclobutrazol 2-4 ppm Prima annaffiatura
in vasi da 12" o HB/5 Gallon	4 (ppp)	10-12 (settimane)	Primavera	paclobutrazol 2-4 ppm Prima annaffiatura
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	7-9 (settimane)	Estate	paclobutrazol 2-4 ppm Prima annaffiatura
8"/2 Gallon	1 (ppp)	7-9 (settimane)	Estate	paclobutrazol 2-4 ppm Prima annaffiatura
in vasi da 10" o HB/3 Gallon	1-3 (ppp)	8-10 (settimane)	Estate	paclobutrazol 2-4 ppm Prima annaffiatura
in vasi da 12" o HB/5 Gallon	4 (ppp)	8-10 (settimane)	Estate	paclobutrazol 2-4 ppm Prima annaffiatura

Consigli per la coltivazione di piante finite

Evitare il trattamento con B-Nine/Alar e Topflor per il controllo dell'altezza. Questi prodotti hanno infatti un effetto negativo sullo sviluppo di Bacopa.

NOTA: Le informazioni fornite sono da intendersi come semplici linee guida per i produttori. PanAmerican Seed consiglia ai produttori di condurre una prova delle varietà nelle condizioni di coltivazione locali. La durata della coltivazione dipende da condizioni climatiche, area geografica, stagione e condizioni all'interno della serra. È responsabilità del produttore verificare se il prodotto è autorizzato nel paese in questione, oltre che leggere attentamente e rispettare le indicazioni riportate sulle etichette relative ai prodotti. Il presente documento non costituisce in alcun modo una garanzia da parte di PanAmerican Seed dei prodotti ivi elencati. Tutti i prodotti ivi elencati sono soggetti ai termini e alle condizioni di vendita di PanAmerican Seed.

Immagini delle varietà



Healing Waters



Silk N' Satin

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2021 Ball Horticultural Company