

Fuseables® Serie Bacopa

(*Sutera cordata*)

Coltivazione piante annuali (rivisto/adatto 14/08/19)

Informazioni generali

Esposizione	Periodo di fioritura	Altezza	Larghezza	Spaziare
Sole	Inizio primavera, Primavera, Fine primavera, Estate, Fine estate, Autunno	2-6 in. (5-15 cm)	12-18 in. (30-46 cm)	8-20 in. (20-51 cm)

Germinazione

Tipo di seme	Dimensioni consigliate del plug	Semi/alveolo	Durata della coltivazione in plug (settimane)	Numero di giorni necessari per la germinazione	Valori pH/CE (1:2) substrato di semina	Copertura seme
PMPL	128 288	1	4-5	4	5,5-6,0 pH 0,75 mmhos/cm	No

Produzione giovani piante

	Fase di viluppo 1	Fase di viluppo 2	Fase di viluppo 3	Fase di viluppo 4
Umidità del substrato	Livello 4	Livello 3-4	Livello 3-4	Livello 3
Temperatura	68-73°F (20-23°C)	68-70°F (20-21°C)	65-70°F (18-21°C)	59-65°F (15-18°C)
Luce	Luce	1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	2.500-5.000 f.c. (26.900-53.800 Lux)
Fertilizzazione		Meno di 100 mg N (Meno di 0,7 CE)	da 100 a 175 mg N (0,7-1,2 CE)	da 100 a 175 mg N (0,7-1,2 CE)

Continuazione della coltivazione fino al prodotto finale

Temperatura fase finale della coltivazione	Valori pH/CE (1:2) substrato di coltivazione	Fertilizzazione	Lunghezza giorno
(giorno) 59-76°F (15-24°C)	5,8-6,2 pH	da 175 a 225 mg N	Giorno neutro / Neutrodienze
(notte) 55-60°F (13-16°C)	1,2-1,5 mmhos/cm	(1,2-1,5 CE)	

Programmazione della coltivazione

Dimensioni del vaso/contenitore	Piante/vaso	Durata della coltivazione	Stagione	Fitoregolatori / Regolatori di crescita
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	6-7 (settimane)	Primavera	daminozide 1.000-1.500 ppm Nebulizzare/Spruzzare
8"/2 Gallon	3 (ppp)	6-7 (settimane)	Primavera	daminozide 1.000-1.500 ppm Nebulizzare/Spruzzare
in vasi da 10" o HB/3 Gallon	4 (ppp)	6-7 (settimane)	Primavera	daminozide 1.000-1.500 ppm Nebulizzare/Spruzzare
in vasi da 12" o HB/5 Gallon	4 (ppp)	6-7 (settimane)	Primavera	daminozide 1.000-1.500 ppm Nebulizzare/Spruzzare

Linee guida alla fertilizzazione

Utilizzare un fertilizzante a base prevalentemente azotata e a basso tenore di fosforo.

Problemi più comuni

Insetti: Soggetto ad attacchi da parte di aleurodidi

Consigli per la coltivazione di piante finite

Evitare tanto le innaffiature eccessive quanto la siccità. L'eventuale appassimento delle piante porta alla perdita dei boccioli.

NOTA: Le informazioni fornite sono da intendersi come semplici linee guida per i produttori. PanAmerican Seed consiglia ai produttori di condurre una prova delle varietà nelle condizioni di coltivazione locali. La durata della coltivazione dipende da condizioni climatiche, area geografica, stagione e condizioni all'interno della serra. È responsabilità del produttore verificare se il prodotto è autorizzato nel paese in questione, oltre che leggere attentamente e rispettare le indicazioni riportate sulle etichette relative ai prodotti. Il presente documento non costituisce in alcun modo una garanzia da parte di PanAmerican Seed dei prodotti ivi elencati. Tutti i prodotti ivi elencati sono soggetti ai termini e alle condizioni di vendita di PanAmerican Seed.

Immagini delle varietà



Utopia

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2021 Ball Horticultural Company