

Salvia Lancelot

(*Salvia canariensis*)

Coltivazione piante annuali (rivisto/adatto 14/01/21)

Informazioni generali

Esposizione	Periodo di fioritura	Altezza	Larghezza	Spaziare
Esposizione parziale al sole, Sole	Estate	36-42 in. (91-107 cm)	24-30 in. (61-76 cm)	14-16 in. (36-41 cm)

Germinazione

Tipo di seme	Dimensioni consigliate del plug	Semi/alveolo	Durata della coltivazione in plug (settimane)	Numero di giorni necessari per la germinazione	Valori pH/CE (1:2) substrato di semina	Copertura seme
RAW	288	1	4-5	3-5	5,5-5,8 pH 0,75 mmhos/cm	No

Produzione giovani piante

	Fase di viluppo 1	Fase di viluppo 2	Fase di viluppo 3	Fase di viluppo 4
Umidità del substrato	Livello 4	Livello 3-4	Livello 2-4	Livello 2-4
Temperatura	68-72°F (20-22°C)	59-68°F (15-20°C)	59-68°F (15-20°C)	59-68°F (15-20°C)
Luce	Facoltativo	1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	3.000 f.c. (32.300 Lux)	3.000 f.c. (32.300 Lux)
Fertilizzazione		Meno di 100 mg N (Meno di 0,7 CE)	Meno di 100 mg N (Meno di 0,7 CE)	Meno di 100 mg N (Meno di 0,7 CE)
Fitoregolatori / Regolatori di crescita			daminozide/2.500 ppm/Nebulizzare/Spruzzare	

Consigli per la propagazione

Mantenere l'umidità al livello 4 durante la Fase 1. Un substrato saturo (livello 5) può ridurre la germinazione. Daminozide a 2.500 ppm o paclobutrazol 5 ppm somministrati per nebulizzazione sono efficaci nella stessa misura sugli alveoli di *Salvia canariensis*. Somministrare in Fase 3 e, se necessario, ripetere per controllare la filatura.

Continuazione della coltivazione fino al prodotto finale

Temperatura fase finale della coltivazione	Valori pH/CE (1:2) substrato di coltivazione	Fertilizzazione	Lunghezza giorno
(giorno) 65-72°F (18-22°C) (notte) 62-65°F (17-18°C)	5,5-5,8 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	da 225 a 300 mg N (1,5-2,0 CE)	Giorno lungo facoltativo / Longigiurne facoltative

Raccomandazione lunghezza del giorno

Pianta longigiurna facoltativa, con una lunghezza critica del giorno pari a 13 ore.

Programmazione della coltivazione

Dimensioni del vaso/contenitore	Piante/vaso	Durata della coltivazione	Stagione	Fitoregolatori / Regolatori di crescita
Vassoio per la semina - 306 alveoli	1 (ppp)	4-5 (settimane)	Primavera	daminozide 2.500 ppm Nebulizzare/Spruzzare
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	5-6 (settimane)	Primavera	daminozide 2.500 ppm Nebulizzare/Spruzzare
5"/6"/1 Gallon	2 (ppp)	7-8 (settimane)	Primavera	daminozide 2.500-5.000 ppm Nebulizzare/Spruzzare

Linee guida alla fertilizzazione

Quando sono coltivate con livelli di fertilizzanti da bassi a medi, le piante possono mostrare ingiallimento delle foglie basali.

Consigli per la coltivazione di piante finite

Somministrazioni di fitoregolatori possono essere effettuate due settimane dopo il trapianto e ripetute dopo 7-10 giorni se necessario. In alternativa alla daminozide si può effettuare un trattamento con paclobutrazol alla dose di 0,5-1,0 ppm. Paclobutrazol non è indicato per somministrazioni precoci in vasi da 4 litri, perché potrebbe provocare una crescita stentata. Tutte le raccomandazioni riguardo alla cultura del prodotto finito si riferiscono a piante non (ancora) fiorite con fogliame argentato. Aggiungere 4-5 settimane al tempo di produzione per la fioritura in condizioni di giorno lungo. Per la produzione di piante finite fiorite, i vasi da ≥ 4 litri sono i più appropriati.

NOTA: Le informazioni fornite sono da intendersi come semplici linee guida per i produttori. PanAmerican Seed consiglia ai produttori di condurre una prova delle varietà nelle condizioni di coltivazione locali. La durata della coltivazione dipende da condizioni climatiche, area geografica, stagione e condizioni all'interno della serra. È responsabilità del produttore verificare se il prodotto è autorizzato nel paese in questione, oltre che leggere attentamente e rispettare le indicazioni riportate sulle etichette relative ai prodotti. Il presente documento non costituisce in alcun modo una garanzia da parte di PanAmerican Seed dei prodotti ivi elencati. Tutti i prodotti ivi elencati sono soggetti ai termini e alle condizioni di vendita di PanAmerican Seed.


Immagini delle varietà




Lancelot



Lancelot



Lancelot



Lancelot



Lancelot

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2021 Ball Horticultural Company