

Zinnia Serie Double Zahara™

(Zinnia marylandica)

Coltivazione piante annuali (rivisto/adatto 22/10/19)

Informazioni generali

| Esposizione | Periodo di fioritura | Altezza | Larghezza | Spaziare |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Sole | Primavera, Fine primavera, Estate, Fine estate, Autunno | 16-20 in. (41-51 cm) | 16-20 in. (41-51 cm) | 8-10 in. (20-25 cm) |

Germinazione

| Tipo di seme | Dimensioni consigliate del plug | Semi/alveolo | Durata della coltivazione in plug (settimane) | Numero di giorni necessari per la germinazione | Valori pH/CE substrato di semina | Copertura seme |
|--------------|---------------------------------|--------------|---|--|----------------------------------|----------------|
| COT, RAW | 288 | 1 | 3 | 2-3 | 5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm | Si |

Produzione giovani piante

| | Fase di viluppo 1 | Fase di viluppo 2 | Fase di viluppo 3 | Fase di viluppo 4 |
|--|----------------------|---|--|---|
| Umidità del substrato | Livello 4 | Livello 3-4 | Livello 3-4 | Livello 3 |
| Temperatura | 68-73°F (20-23°C) | 68-76°F (20-24°C) | 68-76°F (20-24°C) | 65-70°F (18-21°C) |
| Luce | Facoltativo | 1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux) | 1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux) | 2.500-5.000 f.c. (26.900-53.800 Lux) |
| Fertilizzazione | | Meno di 100 mg N - Meno di 0,7 CE | da 100 a 175 mg N - 0,7-1,2 CE | da 100 a 175 mg N - 0,7-1,2 CE |
| Fitoregolatori / Regolatori di crescita | | | daminozide/1.250-2.500 ppm/Nebulizzare/Spruzzare | |

Consigli per la propagazione

Evitare livelli di umidità eccessiva su piante e fiori. Soggetta ad episodi di botrite.

Continuazione della coltivazione fino al prodotto finale

| Temperatura fase finale della coltivazione | Valori pH/CE substrato di coltivazione | Fertilizzazione | Lunghezza giorno |
|---|--|--------------------------------|--|
| (giorno) 65-70°F (18-21°C) (notte) 59-64°F (15-18°C) | 5,5-6,0 pH 1,2-1,5 mmhos/cm | da 175 a 225 mg N - 1,2-1,5 CE | Giorno corto facoltativo / Breviurne facoltative |

Programmazione della coltivazione

| Dimensioni del vaso/contenitore | Piante/vaso | Durata della coltivazione | Stagione | Fitoregolatori / Regolatori di crescita |
|---------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|--|
| 4"/4.5"/Quart | 1 (ppp) | 8-9 (settimane) | Primavera | daminozide 3.500-5.000 ppm Nebulizzare/Spruzzare |
| 5"/6"/1 Gallon | 3 (ppp) | 8-9 (settimane) | Primavera | daminozide 3.500-5.000 ppm Nebulizzare/Spruzzare |
| 4"/4.5"/Quart | 1 (ppp) | 5-6 (settimane) | Estate | daminozide 3.500-5.000 ppm Nebulizzare/Spruzzare |
| 5"/6"/1 Gallon | 3 (ppp) | 5-6 (settimane) | Estate | daminozide 3.500-5.000 ppm Nebulizzare/Spruzzare |

Linee guida alla fertilizzazione

Evitare carenze nutritive durante la produzione, poiché queste risultano in fiori meno pieni.

Problemi più comuni

Insetti: Soggetto ad attacchi da parte di afidi nella fase iniziale della produzione, e di tisanotteri durante la fioritura. Malattie: Evitare livelli di umidità e condensa elevati all'interno della serra, poiché queste condizioni favoriscono lo sviluppo di botrite e oidio.

Consigli per la coltivazione di piante finite

Condizioni di luminosità elevata permettono di ottenere fiori più pieni e di colore più intenso.

NOTA: Le informazioni fornite sono da intendersi come semplici linee guida per i produttori. PanAmerican Seed consiglia ai produttori di condurre una prova delle varietà nelle condizioni di coltivazione locali. La durata della coltivazione dipende da condizioni climatiche, area geografica, stagione e condizioni all'interno della serra. È responsabilità del produttore verificare se il prodotto è autorizzato nel paese in questione, oltre che leggere attentamente e rispettare le indicazioni riportate sulle etichette relative ai prodotti. Il presente documento non costituisce in alcun modo una garanzia da parte di PanAmerican Seed dei prodotti ivi elencati. Tutti i prodotti ivi elencati sono soggetti ai termini e alle condizioni di vendita di PanAmerican Seed.

Immagini delle varietà



Bright Orange




Cherry



Fire



Raspberry
Ripple



Salmon



White



Yellow
Improved



Brilliant Mixture



Mixture

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2020 Ball Horticultural Company