

Trachelium Serie Lake

(*Trachelium caeruleum*)

Coltivazione fiori recisi (rivisto/adatto 13/10/23)

Informazioni generali

Tipo di Coltivazione	Utilizzo	Lunghezza dello stelo	Gruppo (tempistica)
Serra	Riempitivo	30-42 in. (76-107 cm)	N/A

Germinazione

Tipo di seme	Dimensioni consigliate del plug	Semi/alveolo	Durata della coltivazione in plug (settimane)	giorni dal 50% alla germinazione massima	Valori pH/CE (1:2) substrato di semina	Copertura seme
PEL	288	1	7-9	5-7	6,0 pH 0,5-0,9 mmhos/cm	No

Produzione giovani piante

	Fase di viluppo 1	Fase di viluppo 2	Fase di viluppo 3	Fase di viluppo 4
Umidità del substrato	Livello 4	Livello 3-4	Livello 2-3	Livello 2-3
Temperatura	62-70°F (17-21°C)	62-70°F (17-21°C)	62-70°F (17-21°C)	62-70°F (17-21°C)
Luce	Facoltativo			
Fertilizzazione	Meno di 100 mg N (Meno di 0,7 CE)	Meno di 100 mg N (Meno di 0,7 CE)	da 100 a 175 mg N (0,7-1,2 CE)	da 100 a 175 mg N (0,7-1,2 CE)

Consigli per la propagazione

Nella fase di germinazione, Trachelium è molto sensibile a livelli elevati di salinità, in particolar modo se il livello di ammonio è alto.

Continuazione della coltivazione fino al prodotto finale

Valori pH/CE (1:2) substrato di coltivazione	Fertilizzazione	Lunghezza giorno
6,0 pH 2,0-2,25 mmhos/cm	da 175 a 225 mg N (1,2-1,5 CE)	Giorno lungo necessario / Longidiurne obbligate

Raccomandazione lunghezza del giorno

Trachelium necessita di una lunghezza del giorno pari a 16 ore.

Programmazione della coltivazione

Tipo di Coltivazione	Sostegno	Temperatura	Densità	Durata della coltivazione
Serra	Raccomandato	16-26°C/60-78°F (day) 11-20°C/52-68°F (night)	6 piante/ft2 (65 piante/m2)	10-14 settimane

Problemi più comuni

Insetti: Afidi, tortrici, tripidi Malattie: Infezioni batteriche, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia

Consigli per la coltivazione di piante finite

Questa serie offre le migliori opportunità per la produzione lungo tutto l'arco dell'anno in regioni a clima mite. Serie dalla fioritura interstagionale (gruppo transizionale 3), per la ripicchettatura da metà inverno a inizio primavera e fioritura da fine primavera a inizio estate. Alternativamente, può anche essere trapiantata da fine estate a inizio autunno per la fioritura dall'autunno a inizio inverno.

Raccolta

Raccogliere gli steli quando metà o più dei fiorellini è aperta.

Pre-trattamento


Utilizzare di preferenza acqua pulita o una soluzione per mantenimento. Immagazzinare a 4 °C (40 °F). Evitare l'esposizione all'etilene; si raccomanda di effettuare un trattamento che inibisce l'etilene.

Vita in vaso


Vita in vaso media di 11 giorni. Se si tiene più a lungo in cella frigorifera, diminuisce la vita in vaso.

NOTA: Le informazioni fornite sono da intendersi come semplici linee guida per i produttori. PanAmerican Seed consiglia ai produttori di condurre una prova delle varietà nelle condizioni di coltivazione locali. La durata della coltivazione dipende da condizioni climatiche, area geografica, stagione e condizioni all'interno della serra. È responsabilità del produttore verificare se il prodotto è autorizzato nel paese in questione, oltre che leggere attentamente e rispettare le indicazioni riportate sulle etichette relative ai prodotti. Il presente documento non costituisce in alcun modo una garanzia da parte di PanAmerican Seed dei prodotti ivi elencati. Tutti i prodotti ivi elencati sono soggetti ai termini e alle condizioni di vendita di PanAmerican Seed.

Immagini delle varietà




Forest Purple




Michigan Blue



Michigan
Purple



Michigan Violet



Michigan White



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2024 Ball Horticultural Company