

## Pepper Snackabelle Red F<sub>1</sub>

(*Capsicum annuum*)

Coltivazione ortaggi (rivisto/adatto 19/01/21)

### Informazioni generali

| Esposizione | Periodo di fioritura   | Altezza                 | Larghezza               | Spaziare                |
|-------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Sole        | Fine primavera, Estate | 18-24 in.<br>(46-61 cm) | 12-18 in.<br>(30-46 cm) | 12-18 in.<br>(30-46 cm) |

### Germinazione

| Tipo di seme | Dimensioni consigliate del plug | Semi/alveolo | Durata della coltivazione in plug (settimane) | giorni dal 50% alla germinazione massima | Valori pH/CE (1:2) substrato di semina | Copertura seme    |
|--------------|---------------------------------|--------------|---|--|--|-------------------|
| RAW          | 288                             | 1            | 5-6   | 5-7                                      | 5,8-6,2 pH<br>0,75 mmhos/cm            | Copertura sottile |

### Produzione giovani piante

|                              | Fase di viluppo 1                    | Fase di viluppo 2                       | Fase di viluppo 3                       | Fase di viluppo 4                       |
|------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| <b>Umidità del substrato</b> | Livello 4                            | Livello 3-4                             | Livello 2-4                             | Livello 2-4                             |
| <b>Temperatura</b>           | 70-78°F<br>(21-26°C)                 | 68-72°F<br>(20-22°C)                    | 65-70°F<br>(18-21°C)                    | 62-67°F<br>(17-19°C)                    |
| <b>Luce</b>                  | Facoltativo                          | 1.000-2.500 f.c.<br>(10.800-26.900 Lux) | 1.000-2.500 f.c.<br>(10.800-26.900 Lux) | 2.500-5.000 f.c.<br>(26.900-53.800 Lux) |
| <b>Fertilizzazione</b>       | Meno di 100 mg N<br>(Meno di 0,7 CE) | Meno di 100 mg N<br>(Meno di 0,7 CE)    | da 100 a 175 mg N<br>(0,7-1,2 CE)       | da 100 a 175 mg N<br>(0,7-1,2 CE)       |

### Linee guida alla fertilizzazione

Nella fase di germinazione, i peperoni sono molto sensibili a livelli elevati di salinità, in particolar modo se il livello di ammonio è alto. Mantenere il livello di azoto ammonico al di sotto di 10 ppm.

### Consigli per la propagazione

L'altezza può essere controllata mediante la sospensione del trattamento fertilizzante; evitando le innaffiature eccessive; coltivando in condizioni di luminosità elevata e utilizzando il DIF quando è possibile. In caso di necessità e per controllare l'altezza delle piante, trattare con uniconazole (Sumagic) a una concentrazione di 2,5-5,0 ppm, due settimane dopo la semina. Ripetere il trattamento dopo ulteriori 2 settimane se necessario.

### Continuazione della coltivazione fino al prodotto finale

| Temperatura fase finale della coltivazione              | Valori pH/CE (1:2) substrato di coltivazione | Fertilizzazione                   | Lunghezza giorno |
|---|--|-----------------------------------|------------------|
| (giorno) 68-80°F (20-27°C)<br>(notte) 65-70°F (18-21°C) | 5,5-6,2 pH<br>1,0 mmhos/cm                   | da 100 a 175 mg N<br>(0,7-1,2 CE) | -                |

### Giorni per la produzione di frutti verdi

55-60

### Giorni per la produzione di frutti maturi

70-75

## Programmazione della coltivazione

| Dimensioni del vaso/contenitore | Piante/vaso | Durata della coltivazione | Stagione  | Fitoregolatori / Regolatori di crescita |
|---------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|---|
| Vassoio alveolare per la semina | 1 (ppp)     | 4-6 (settimane)           | Primavera | -                                       |
| 4"/4,5"/Quart                   | 1 (ppp)     | 4-6 (settimane)           | Primavera | -                                       |
| 5"/6"/1 Gallon                  | 1 (ppp)     | 5-7 (settimane)           | Primavera | -                                       |

### Consigli per la coltivazione di piante finite

Dà buoni risultati tanto in piena terra quanto in vaso, con o senza supporto.

**NOTA:** Le informazioni fornite sono da intendersi come semplici linee guida per i produttori. PanAmerican Seed consiglia ai produttori di condurre una prova delle varietà nelle condizioni di coltivazione locali. La durata della coltivazione dipende da condizioni climatiche, area geografica, stagione e condizioni all'interno della serra. È responsabilità del produttore verificare se il prodotto è autorizzato nel paese in questione, oltre che leggere attentamente e rispettare le indicazioni riportate sulle etichette relative ai prodotti. Il presente documento non costituisce in alcun modo una garanzia da parte di PanAmerican Seed dei prodotti ivi elencati. Tutti i prodotti ivi elencati sono soggetti ai termini e alle condizioni di vendita di PanAmerican Seed.

## Immagini delle varietà



Snackabelle  
Red



Snackabelle  
Red



Snackabelle  
Red



PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185  
+1 800-231-7065 [PanAmSeed.com](http://PanAmSeed.com)

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2024 Ball Horticultural Company