# GrowerFacts

PanAmerican Seed®

## Herb (SimplyHerbs™) Rosemary

*(Rosmarinus officinalis)*

Coltivazione ortaggi (rivisto/adatto 15/02/23)

## Informazioni generali

| Esposizione | Periodo di fioritura | Altezza | Larghezza | Spaziare |
|---|---|---|---|---|
| Sole | Estate | 12-24 in.<br>(30-61 cm) | 12-24 in.<br>(30-61 cm) | 12-18 in.<br>(30-46 cm) |

## Germinazione

| Tipo di seme | Dimensioni consigliate del plug | Semi/alveolo | Durata della coltivazione in plug (settimane) | giorni dal 50% alla germinazione massima | Valori pH/CE (1:2) substrato di semina | Copertura seme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMPL | 128 | 1 | 4-5 | 5-8 | 5,5-5,8 pH<br>0,75 mmhos/cm | Sì |

## Produzione giovani piante

| | Fase di viluppo 1 | Fase di viluppo 2 | Fase di viluppo 3 | Fase di viluppo 4 |
|---|---|---|---|---|
| **Umidità del substrato** | Livello 4 | Livello 3-4 | Livello 2-3 | Livello 2-3 |
| **Temperatura** | 68-72°F<br>(20-22°C) | 68-72°F<br>(20-22°C) | 65-68°F<br>(18-20°C) | 62-65°F<br>(17-18°C) |
| **Luce** | Luce | 500-1.000 f.c.<br>(5.400-10.800 Lux) | 1.000-1.500 f.c.<br>(10.800-16.100 Lux) | 1.500-2.500 f.c.<br>(16.100-26.900 Lux) |
| **Fertilizzazione** | Meno di 100 mg N<br>(Meno di 0,7 CE) | Meno di 100 mg N<br>(Meno di 0,7 CE) | da 100 a 175 mg N<br>(0,7-1,2 CE) | Meno di 100 mg N<br>(Meno di 0,7 CE) |

### Consigli per la propagazione

La semina può essere effettuata direttamente nel vaso definitivo. It is important to keep soil consistently moist until germination occurs so pellet can adequately break down.

## Continuazione della coltivazione fino al prodotto finale

| Temperatura fase finale della coltivazione | Valori pH/CE (1:2) substrato di coltivazione | Fertilizzazione | Lunghezza giorno |
|---|---|---|---|
| **(giorno)** 60-65°F (16-18°C)<br>**(notte)** 55-60°F (13-16°C) | 5,5-6,2 pH<br>1,0 mmhos/cm | da 100 a 175 mg N<br>(0,7-1,2 CE) | - |

## Programmazione della coltivazione

| Dimensioni del vaso/contenitore | Piante/vaso | Durata della coltivazione | Stagione | Fitoregolatori / Regolatori di crescita |
|---|---|---|---|---|
| Vassoio alveolare per la semina | 1 (ppp) | 4-5 (settimane) | Primavera | - |
| 4"/4,5"/Quart | 1 (ppp) | 4-5 (settimane) | Primavera | - |

### Consigli per la coltivazione di piante finite

La semina può essere effettuata direttamente nel vaso definitivo.

**NOTA:** Le informazioni fornite sono da intendersi come semplici linee guida per i produttori. PanAmerican Seed consiglia ai produttori di condurre una prova delle varietà nelle condizioni di coltivazione locali. La durata della coltivazione dipende da condizioni climatiche, area geografica, stagione e condizioni all'interno della serra. È responsabilità del produttore verificare se il prodotto è autorizzato nel paese in questione, oltre che leggere attentamente e rispettare le indicazioni riportate sulle etichette relative ai prodotti. Il presente documento non costituisce in alcun modo una garanzia da parte di PanAmerican Seed dei prodotti ivi elencati. Tutti i prodotti ivi elencati sono soggetti ai termini e alle condizioni di vendita di PanAmerican Seed.

## Immagini delle varietà

Rosemary

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road,West Chicago, Illinois, USA, 60185
**+1 800-231-7065 PanAmSeed.com**

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2024 Ball Horticultural Company