

Pansy Серии Panola® F₁

(*Viola x wittrockiana*)

Производство однолетних растений (обновлено 10.01.18)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Полутень	Ранняя весна, Весна, Осень	6-8 в . (15-20 cm)	8-10 в . (20-25 cm)	8-12 в . (20-30 cm)

Проращивание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	Период от посева до пикировки	Дней до появления всходов	Базовые значения pH ЕС	Присыпание семян
PRM, RAW	288	1	5	3-4	5,5-5,8 pH 0,75 mmhos/cm	Да

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3-4	Уровень 3-4	Уровень 2-4
Температура	65-70°F 18-21°C	60-65°F 16-18°C	60-65°F 16-18°C	55-60°F 13-16°C
Освещенность	Опционально	2 500 фут/свеча =10.7 люкс (26 900 Lux)	2 500 фут/свеча =10.7 люкс (26 900 Lux)	5 000 фут/свеча =10.7 люкс (53 800 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N - Менее 0.7 ЕС	от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС	от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС
Ингибиторы роста			анцимидол/5-10 ppm/Опрыскивание даминозид/1 500-2 500 ppm/Опрыскивание	анцимидол/5-10 ppm/Опрыскивание даминозид/1 500-2 500 ppm/Опрыскивание

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	требуемые значения pH ЕС	Подкормки	Длина дня
(день) 60-70°F16-21°C (ночь) 50-55°F10-13°C	5,5-5,8 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	от 175 до 225 ppm N - от 1.2 до 1.5 ЕС	Растение факультативного длинного дня

Расчет выхода готовой продукции

Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Ингибиторы роста
Cell Pack	1 (ppp)	5-6 (неделя)	Ранняя весна	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 1 500/150-2 500/250 ppm Опрыскивание
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	5-6 (неделя)	Ранняя весна	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 1 500/150-2 500/250 ppm Опрыскивание
Cell Pack	1 (ppp)	3-4 (неделя)	Осень	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 2 500/250-5 000/500 ppm Опрыскивание
Cell Pack	1 (ppp)	3-4 (неделя)	Осень	паклобутразол 0,1-0,125 ppm Смочить
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	4-5 (неделя)	Осень	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 2 500/250-5 000/500 ppm Опрыскивание
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	4-5 (неделя)	Осень	паклобутразол 0,1-0,125 ppm Смочить

Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта



Lilac Shades



Pink Shades



Primrose



Yellow & Purple



Silhouette Mixture

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2019 Ball Horticultural Company