

Pansy Серии Panola® XP F₁

(Viola x wittrockiana)

Производство однолетних растений (обновлено 10.01.18)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Полутень	Ранняя весна, Весна, Осень	6-8 в . (15-20 cm)	8-10 в . (20-25 cm)	6-8 в . (15-20 cm)

Проращивание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	Период от посева до пикировки	Дней до появления всходов	Базовые значения pH ЕС	Присыпание семян
PRM, RAW	288	1	5	3-4	5,5-5,8 pH 0,75 mmhos/cm	Да

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3-4	Уровень 3-4	Уровень 2-4
Температура	65-70°F 18-21°C	60-65°F 16-18°C	60-65°F 16-18°C	55-60°F 13-16°C
Освещенность	Опционально	2 500 фут/свеча =10.7 люкс (26 900 Lux)	2 500 фут/свеча =10.7 люкс (26 900 Lux)	5 000 фут/свеча =10.7 люкс (53 800 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N - Менее 0.7 ЕС	от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС	от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС
Ингибиторы роста			анцимидол/5-10 ppm/Опрыскивание даминозид/1 500-2 500 ppm/Опрыскивание	анцимидол/5-10 ppm/Опрыскивание даминозид/1 500-2 500 ppm/Опрыскивание

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	требуемые значения pH ЕС	Подкормки	Длина дня
(день) 60-70°F16-21°C (ночь) 50-55°F10-13°C	5,5-5,8 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС	Растение факультативного длинного дня

Расчет выхода готовой продукции

Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Ингибиторы роста
Cell Pack	1 (ppp)	5-6 (неделя)	Ранняя весна	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 1 500/150-2 500/250 ppm Опрыскивание
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	5-6 (неделя)	Ранняя весна	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 1 500/150-2 500/250 ppm Опрыскивание
Cell Pack	1 (ppp)	3-4 (неделя)	Осень	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 2 500/500-5 000/500 ppm Опрыскивание
Cell Pack	1 (ppp)	3-4 (неделя)	Осень	паклобутразол 0,1-0,125 ppm Смочить
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	4-5 (неделя)	Осень	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 2 500/500-5 000/500 ppm Опрыскивание
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	3-4 (неделя)	Осень	паклобутразол 0,1-0,125 ppm Смочить

Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.


Фотографии сорта



Beaconsfield



Deep Blue Blotch




Deep Orange



Fire



Marina



Purple



Purple Face



Rose Picotee



Scarlet



Sunburst




True Blue



White



White Blotch



Yellow




Yellow Blotch



Autumn Blaze Mixture



Baby Boy Mixture



Blackberry Sundae Mixture



Blotch Mixture



Citrus Mixture



Clear Mixture



Halloween Mixture



Mixture

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2019 Ball Horticultural Company