

Petunia Серии Debonair™ F₁

(*Petunia x hybrida*)

Однолетние растения (обновлено 27.03.18)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Весна, Поздняя весна, Лето	10-15 в . (25-38 cm)	10-12 в . (25-30 cm)	10-14 в . (25-36 cm)

Проращивание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	Появление всходов (дней)	Базовые значения pH ЕС	Присыпание семян
PEL, RAW	288	1	4-5	3-5	5,5-5,8 pH 0,75-1,0 mmhos/cm	Нет

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4-5	Уровень 3-4	Уровень 2-4	Уровень 2-4
Температура	72-76°F 22-24°C	68-75°F 20-24°C	65-70°F 18-21°C	60-65°F 16-18°C
Освещенность	Освещенность	1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	2 500-4 000 фут-свечей (26 900-43 100 Lux)	2 500-5 000 фут-свечей (26 900-53 800 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N - Менее 0.7 ЕС	от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС	от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС
Регуляторы роста			даминозид/2 500-5 000 ppm/Опрыскивание	даминозид/2 500-5 000 ppm/Опрыскивание

Ключевые моменты выращивания

Регуляторы роста, включая Паклобутразол или Флурпримидол.

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	требуемые значения pH ЕС	Подкормки	Длина дня
(день) 62-70°F/17-21°C (ночь) 55-65°F/13-18°C	5,5-6,2 pH 1,0-1,5 mmhos/cm	от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС	Факультативный длинный день

Расчет длины дня

Все сорта могут успешно цвести при 10 часовой длине дня.

Расчет выхода готовой продукции

Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	5-6 (неделя)	Весна	паклобутразол 2-3 ppm Смочить
10" Pot or HB/3 Gallon	3 (ppp)	6-7 (неделя)	Весна	паклобутразол 2-3 ppm Смочить
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	3-5 (неделя)	Лето	паклобутразол 2-3 ppm Смочить

Чувствительность к химическому воздействию

Избегать применения Даминозида на сорте Black Cherry, возможно изменение окраски цветка.

Распространенные проблемы


Насекомые вредители: Трипс, Тля, Грибной комарик, Мухи -береговушки
Болезни: Серая гниль, Ризоктониоз, Питиум

Дополнительная информация


Избегать применения Даминозида на сорте Black Cherry, возможно изменение окраски цветка. В качестве альтернативы Паклбутразол или Флурпримидол.

Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.


Фотографии сорта



Black Cherry



Dusty Rose



Lime Green

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2019 Ball Horticultural Company