

Petunia Серии Mirage F₁

(*Petunia x hybrida*)

Производство однолетних растений (обновлено 10.01.18)

Общая информация

| Расположение | Период цветения | Высота | Ширина | Расстояние между растениями |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Солнечное | Весна, Поздняя весна, Лето, Позднее лето | 10-15 в . (25-38 cm) | 10-12 в . (25-30 cm) | 10-14 в . (25-36 cm) |

Проращивание

| Форма семян | Рекомендуемый размер посевной кассеты | Семян в ячейке | Период от посева до пикировки | Дней до появления всходов | Базовые значения pH ЕС | Присыпание семян |
|-------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|
| PEL, RAW | 288 | 1 | 4-5 | 3-5 | 5,5-5,8 pH 0,75-1,0 mmhos/cm | Нет |

Производство сеянцев

| | Стадия 1 | Стадия 2 | Стадия 3 | Стадия 4 |
|-------------------------|--------------------|--|---|---|
| Увлажнение | Уровень 4-5 | Уровень 3-4 | Уровень 2-4 | Уровень 2-4 |
| Температура | 72-76°F 22-24°C | 68-75°F 20-24°C | 65-70°F 18-21°C | 62-65°F 17-18°C |
| Освещенность | Освещенность | 1 000-2 500 фут/свеча =10.7 люкс (10 800-26 900 Lux) | 2 500-4 000 фут/свеча =10.7 люкс (26 900-43 100 Lux) | 2 500-5 000 фут/свеча =10.7 люкс (26 900-53 800 Lux) |
| Подкормки | | Менее 100ppm N - Менее 0.7 ЕС | от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС | от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС |
| Ингибиторы роста | | | даминозид/2 500-5 000 ppm/Опрыскивание | даминозид/2 500-5 000 ppm/Опрыскивание |

Выращивание до получения готового растения

| Выращивание при температуре | требуемые значения pH ЕС | Подкормки | Длина дня |
|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|
| (день) 62-70°F/17-21°C (ночь) 55-65°F/13-18°C | 5,5-6,2 pH 1,0-1,5 mmhos/cm | от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС | Растение факультативного длинного дня |

Расчет выхода готовой продукции

| Размер посадочной емкости | Сеянцев/горшок | Период выращивания | Сезон | Ингибиторы роста |
|---------------------------|----------------|--------------------|-------|--|
| Cell Pack | 1 (ppp) | 5-6 (неделя) | Весна | даминозид 2 500-5 000 ppm Опрыскивание |
| 10" Pot or HB/3 Gallon | 3 (ppp) | 5-7 (неделя) | Весна | даминозид 2 500-5 000 ppm Опрыскивание |

Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта



Blue



Blue Star



Burgundy Star



Carmine



Chic



Lavender



Lavender Glow



Light Blue



Lilac



Mid-Blue



Orchid



Pink




Pink Chiffon




Plum Crystal




Purple




Red



Red Morn




Red Picotee



Rose



Rose Morn



Salmon



Salmon Morn




Spring



Sugar



Summer



Velvet



White



Yellow



Mixture



Reflections
Mixture

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2019 Ball Horticultural Company