

Ornamental Oregano Kirigami

(*Origanum x hybrida*)

Производство однолетних растений (обновлено 15.02.18)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Поздняя весна, Лето	8-10 в . (20-25 cm)	12-14 в . (30-36 cm)	14-18 в . (36-46 cm)

Проращивание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	Период от посева до пикировки	Дней до появления всходов	Базовые значения pH ЕС	Присыпание семян
RAW	288	4	5-6	4-5	5,8-6,5 pH 0,75 mmhos/cm	Нет

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3	Уровень 3-2	Уровень 2
Температура	68-72°F 20-22°C	65-68°F 18-20°C	65-68°F 18-20°C	60-65°F 16-18°C
Освещенность	Освещенность	2 000-2 500 фут/свеча =10.7 люкс (21 500-26 900 Lux)	2 000-2 500 фут/свеча =10.7 люкс (21 500-26 900 Lux)	3 500-5 000 фут/свеча =10.7 люкс (37 700-53 800 Lux)
Подкормки	Менее 100ppm N - Менее 0.7 EC	Менее 100ppm N - Менее 0.7 EC	от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 EC	от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 EC
Ингибиторы роста			даминозид/1 000-1 500 ppm/Опрыскивание	даминозид/1 000-1 500 ppm/Опрыскивание

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	требуемые значения pH ЕС	Подкормки	Длина дня
(день) 65-68°F 18-20°C (ночь) 60-65°F 16-18°C	5,8-6,5 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	от 175 до 225 ppm N - от 1.2 до 1.5 EC	Требуется длинный день

Расчет выхода готовой продукции


Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Ингибиторы роста
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	10-12 (неделя)	Поздняя весна	даминозид 1 500-2 000 ppm Опрыскивание
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	11-13 (неделя)	Поздняя весна	даминозид 1 500-2 000 ppm Опрыскивание
10" Pot or HB/3 Gallon	3-5 (ppp)	12-13 (неделя)	Поздняя весна	даминозид 1 500-2 000 ppm Опрыскивание
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	9-10 (неделя)	Лето	даминозид 1 500-2 000 ppm Опрыскивание
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	9-11 (неделя)	Лето	даминозид 1 500-2 500 ppm Опрыскивание
10" Pot or HB/3 Gallon	3-5 (ppp)	10-12 (неделя)	Лето	даминозид 2 000-2 500 ppm Опрыскивание

Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.


Фотографии сорта



Kirigami



Kirigami



Kirigami

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2019 Ball Horticultural Company