# GrowerFacts

PanAmericanSeed®

## Pepper (Edible Potted) Hot Burrito

*(Capsicum annuum)*

Овощные культуры (обновлено 14.10.25)

## Общая информация

| Расположение | Период цветения | Высота | Ширина | Расстояние между растениями |
|---|---|---|---|---|
| Солнечное | Лето | 10-12 в .<br>(25-30 cm) | 8-10 в .<br>(20-25 cm) | |

## Прорастание

| Форма семян | Рекомендуемый размер посевной кассеты | Семян в ячейке | До пикировки (недель) | дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания | pH/EC (1:2) субстрат для посева | Присыпание семян |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW | 288 | 1 | 3-4 | 5-6 | 5,4-5,8 pH<br>0,8-1,2 mmhos/cm | Слегка присыпать |

## Производство сеянцев

| | Стадия 1 | Стадия 2 | Стадия 3 | Стадия 4 |
|---|---|---|---|---|
| **Увлажнение** | Уровень 4 | Уровень 3-4 | Уровень 2-4 | Уровень 2-4 |
| **Температура** | 70-73°F<br>(21-23°C) | 68-70°F<br>(20-21°C) | 68-70°F<br>(20-21°C) | 68-70°F<br>(20-21°C) |
| **Освещенность** | Опционально | 1 000-2 500 фут-свечей<br>(10 800-26 900 Lux) | 1 000-2 500 фут-свечей<br>(10 800-26 900 Lux) | 2 500-5 000 фут-свечей<br>(26 900-53 800 Lux) |
| **Подкормки** | Менее 100ppm N<br>(Менее 0.7 EC) | от 100 до 175 ppm N<br>(от 0.7 до 1.2 EC) | от 175 до 225 ppm N<br>(от 1.2 до 1.5 EC) | от 175 до 225 ppm N<br>(от 1.2 до 1.5 EC) |
| **Регуляторы роста** | | | юниконазол/2,5 ppm/Опрыскивание | юниконазол/2,5 ppm/Опрыскивание |

### Ключевые моменты выращивания

Для обеспечения равномерного урожая регулятор роста следует распылять туманным распылителем. Для более мощных сортов применение униконазола в концентрации 2,5 ppm через 10–12 дней после посева, при необходимости повторенное через 2 недели, поможет контролировать размер растений. Для уничтожения микробов: Перед накрыванием убедитесь, что лотки политы водой. Плоское покрытие: сначала уложите один слой покрытия из Reemay, затем один слой белого пластика поверх него. Снимите пластик через 8–10 дней. Держите Reemay влажным. Снимите Reemay через 2–3 дня.

## Выращивание до получения готового растения

| Выращивание при температуре | pH/EC (1:2) субстрат для выращивания | Подкормки | Длина дня |
|---|---|---|---|
| **(день)** 68-80°F (20-27°C)<br>**(ночь)** 66-70°F (19-21°C) | 5,5-5,9 pH<br>1,8-2,5 mmhos/cm | Более 300 ppm N<br>(Более 2.0 EC) | Нейтрально к длине дня |

### Дней до получения зеленых плодов

80-85

### Дней до получения зрелых плодов

95-110

## Расчет выхода готовой продукции

| Размер посадочной емкости | Сеянцев/горшок | Период выращивания | Сезон | Регуляторы роста |
|---|---|---|---|---|
| 5"/6"/1 Gallon | 1 (ppp) | 16 (недель) | Весна | - |
| 8"/2 Gallon | 1 (ppp) | 16 (недель) | Весна | - |
| 5"/6"/1 Gallon | 1 (ppp) | 14 (недель) | Лето | - |
| 8"/2 Gallon | 1 (ppp) | 14 (недель) | Лето | - |

### Применение удобрений

Особенно если растения выращиваются в очень сухих условиях, важно использовать более высокую EC примерно раз в неделю, когда растения поливаются снизу. Обеспечьте достаточный уровень кальция на последней стадии посева.

### Распространенные проблемы

Стручковый перец чаще всего заражается тлей. Мы рекомендуем прикреплять клейкие карточки (1 на стол 20 футов/6 м).

### Дополнительная информация

Сеянцы сажайте глубоко. Поливайте снизу, сохраняя поверхность почвы сухой. До цветения особенно важно выращивать в сухих условиях, Позволяя растениям немного увянуть между поливами. Для оптимизации роста растений, как только растения соприкоснутся, разделите их. Держите растения в очень сухом состоянии от момента посадки до цветения, чтобы избежать вытягивания. Из-за веса плодов мы рекомендуем подвязывать растения для их стабилизации во время транспортировки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

## Фотографии сорта


Hot Burrito


Hot Burrito

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road,West Chicago, Illinois, USA, 60185
**+1 800-231-7065 PanAmSeed.com**

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company