

Coleus, Premium Shade Серии Kong®

(*Solenostemon scutellarioides*)

Однолетние растения (обновлено 27.11.18)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Тень, Полутень	-	18-20 в . (46-51 cm)	15-18 в . (38-46 cm)	15-24 в . (38-61 cm)

Проращивание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	Появление всходов (дней)	Базовые значения pH ЕС	Присыпание семян
PEL	288	1	5-6	4-5	5,5-5,8 pH 0,75 mmhos/cm	Слегка присыпать

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3-4	Уровень 2-4	Уровень 2-4
Температура	72-75°F 22-24°C	72-75°F 22-24°C	68-70°F 20-21°C	60-62°F 16-17°C
Освещенность	Опционально	2 500 фут-свечей (26 900 Lux)	2 500 фут-свечей (26 900 Lux)	2 500-5 000 фут-свечей (26 900-53 800 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N - Менее 0.7 EC	от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 EC	от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 EC

Применение удобрений

Для предотвращения развития болезней, поливать в первой половине дня, вечером листья растений должны быть сухими.

Ключевые моменты выращивания

Колеус очень чувствителен к высокому содержанию солей в почве, особенно к высокому содержанию солей аммония. На стадии проращивания необходимо поддерживать уровень аммония - менее 10ppm. Регуляторы роста, как правило, не требуются.

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	требуемые значения pH ЕС	Подкормки	Длина дня
(день) 68-75°F/20-24°C (ночь) 65-68°F/18-20°C	5,8-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 EC	Факультативный короткий день

Расчет выхода готовой продукции

Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
306 Pack	1 (ppp)	4-5 (неделя)	Весна	-
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	4-5 (неделя)	Весна	-
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	5-6 (неделя)	Весна	-

Распространенные проблемы


Насекомые вредители: Тля, Мучнистый червец, Белокрылка
Болезни: Альтернариоз, Серая гниль, Вертициллез
Прочие: Чрезмерное удлинение междоузлий при низком освещении.

Дополнительная информация

Возможно применение Этефона для усиления ветвления и контроля высоты растений. Не прищипывать, после прищипки может уменьшиться размер листа и задержится выход готовой продукции. Регуляторы роста: серии Kong и Kong Jr. хорошо ветвятся и имеют короткие междоузлия, но из-за очень крупных листьев, растения требуют дополнительного пространства и расстановки до того, как они станут слишком высокими. Регуляторы роста, как правило не требуются. При необходимости, возможно применение B-Nine/Alar (daminozide) 2,500-5,000ppm (0.3-0.6 г/литр концентрация д.в. 85% или 4.0-8.0 г/литр концентрация д.в. 64%) через 2-3 недели после пикировки. Повторная обработка при необходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта




Lime Sprite



Mosaic



Red



Rose



Salmon Pink



Scarlet



Empire Mixture

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2019 Ball Horticultural Company