

Pansy Серии Matrix® F<sub>1</sub>  
(Viola x wittrockiana)

Однолетние растения (обновлено 07.11.23)

Общая информация

| Расположение        | Период цветения                  | Высота           | Ширина                 | Расстояние между растениями |
|---------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| Полутень, Солнечное | Ранняя весна, Весна, Осень, Зима | 8 в .<br>(20 cm) | 8-10 в .<br>(20-25 cm) | 8 в .<br>(20 cm)            |

Проращивание

| Форма семян | Рекомендуемый размер посевной кассеты | Семян в ячейке | До пикировки (недель) | дней от проращивания 50% сеянцев, до максимального проращивания | pH/EC (1:2) субстрат для посева | Присыпание семян |
|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| PRM, RAW    | 288                                   | 1              | 5                     | 3-4                                                             | 5,5-5,8 pH<br>0,75 mmhos/cm     | Да               |

Производство сеянцев

|                  | Стадия 1             | Стадия 2                         | Стадия 3                                                                  | Стадия 4                                                                  |
|------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Увлажнение       | Уровень 4            | Уровень 3-4                      | Уровень 3-4                                                               | Уровень 2-4                                                               |
| Температура      | 65-70°F<br>(18-21°C) | 60-65°F<br>(16-18°C)             | 60-65°F<br>(16-18°C)                                                      | 55-60°F<br>(13-16°C)                                                      |
| Освещенность     |                      | 2 500 фут-свечей<br>(26 900 Lux) | 2 500 фут-свечей<br>(26 900 Lux)                                          | 5 000 фут-свечей<br>(53 800 Lux)                                          |
| Подкормки        |                      | Менее 100ppm N<br>(Менее 0.7 EC) | от 100 до 175 ppm N<br>(от 0.7 до 1.2 EC)                                 | от 100 до 175 ppm N<br>(от 0.7 до 1.2 EC)                                 |
| Регуляторы роста |                      |                                  | анцимидол/5-10 ppm/Опрыскивание<br>даминозид/1 500-2 500 ppm/Опрыскивание | анцимидол/5-10 ppm/Опрыскивание<br>даминозид/1 500-2 500 ppm/Опрыскивание |

Выращивание до получения готового растения

| Выращивание при температуре                          | pH/EC (1:2) субстрат для выращивания | Подкормки                                 | Длина дня                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| (день) 60-70°F (16-21°C)<br>(ночь) 50-55°F (10-13°C) | 5,5-5,8 pH<br>1,5-2,0 mmhos/cm       | от 175 до 225 ppm N<br>(от 1.2 до 1.5 EC) | Факультативный длинный день |

Расчет выхода готовой продукции

| Размер посадочной емкости | Сеянцев/горшок | Период выращивания | Сезон | Регуляторы роста                                                              |
|---------------------------|----------------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Cell Pack                 | 1 (ppp)        | 4-5 (недель)       | Осень | даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 2 500/250-5 000/500 ppm Опрыскивание |
| Cell Pack                 | 1 (ppp)        | 4-5 (недель)       | Осень | паклобутразол 0,125 ppm Смочить                                               |
| 4"/4,5"/Quart             | 1 (ppp)        | 5-6 (недель)       | Осень | даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 2 500/250-5 000/500 ppm Опрыскивание |
| 4"/4,5"/Quart             | 1 (ppp)        | 5-6 (недель)       | Осень | паклобутразол 0,125 ppm Смочить                                               |
| 10" Pot or HB/3 Gallon    | 7-9 (ppp)      | 4-5 (недель)       | Осень | даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 2 500/250-5 000/500 ppm Опрыскивание |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

## Фотографии сорта



PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185  
+1 800-231-7065 [PanAmSeed.com](http://PanAmSeed.com)

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2025 Ball Horticultural Company