

Calibrachoa Серии Kabloom™ F₁

(*Calibrachoa x hybrida*)

Однолетние растения (обновлено 27.11.18)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Ранняя весна, Весна, Поздняя весна, Лето, Позднее лето	8-12 в . (20-30 см)	10-14 в . (25-36 см)	8-12 в . (20-30 см)

Проращивание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	Появление всходов (дней)	Базовые значения pH ЕС	Присыпание семян
PMPL	288 128	1 1	5-6 7-8	5-7	5,5-5,8 pH 0,75 mmhos/cm	Опционально

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 5	Уровень 4	Уровень 2-4	Уровень 2-4
Температура	72-75°F (22-24°C)	68-70°F (20-21°C)	64-68°F (18-20°C)	55-64°F (13-18°C)
Освещенность	Опционально	10-12 mol·m ⁻² ·d ⁻¹	10-15 mol·m ⁻² ·d ⁻¹	10-20 mol·m ⁻² ·d ⁻¹
Подкормки	Менее 100ppm N - Менее 0.7 EC		Менее 100ppm N - Менее 0.7 EC	
Регуляторы роста	даминозид/2 000-2 500 ppm/Опрыскивание паклобутразол/2-3 ppm/Опрыскивание		даминозид/2 000-2 500 ppm/Опрыскивание паклобутразол/2-3 ppm/Опрыскивание	

Ключевые моменты выращивания

Прищипка или обрезка рекомендуется при производстве в маленьких горшках и при низком интеграле дневного освещения. Прищипывая, оставлять не менее 4 узлов.

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	требуемые значения pH ЕС	Подкормки	Длина дня
(день) 64-75°F (18-24°C) (ночь) 55-64°F (13-18°C)	5,5-5,8 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	от 225 до 300 ppm N - от 1.5 до 2.0 EC	Требуется длинный день

Расчет длины дня

10 часов для Kabloom Yellow; 10.5 часов для Kabloom White Improved, Kabloom Orange и Kabloom Blue; 11 часов для Kabloom Denim, Kabloom Pink, Kabloom Cherry и Kabloom Coral; 11.5 часов для Kabloom Light Pink Blast. Интеграл дневного освещения должен быть на уровне 10-25 моль· м⁻²·день⁻¹.

Расчет выхода готовой продукции


Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	7-8 (неделя)	Весна	флурпиримидол 1-2 ppm Смочить
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	7-8 (неделя)	Весна	паклбутразол 1-3 ppm Смочить
10" Pot or HB/3 Gallon	3 (ppp)	9-11 (неделя)	Весна	флурпиримидол 2-3 ppm Смочить
10" Pot or HB/3 Gallon	3 (ppp)	9-11 (неделя)	Весна	паклбутразол 2-3 ppm Смочить
10" Pot or HB/3 Gallon	3 (ppp)	5-6 (неделя)	Лето	флурпиримидол 2-3 ppm Смочить
10" Pot or HB/3 Gallon	3 (ppp)	5-6 (неделя)	Лето	паклбутразол 2-3 ppm Смочить

Применение удобрений


Calibrachoa требует применения усиленной схемы питания. При необходимости, железо может быть внесено дополнительно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.


Фотографии сорта



Blue



Cherry



Coral




Denim




Light Pink Blast




Orange



Pink



White Improved



Yellow

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2019 Ball Horticultural Company