



Dianthus Серии Sweet™ F₁

(*Dianthus barbatus*)

Срезочные культуры (обновлено 28.10.20)

Общая информация

| Тип производства | Использование | Длина стебля | Группа по срокам цветения |
|--|--|-------------------------|---------------------------|
| Теплица, Пленочная теплица с открытыми торцами | Аранжировочная зелень, Дополнительные элементы | 18-36 в . (46-91 cm) | N/A |

Проращивание

| Форма семян | Рекомендуемый размер посевной кассеты | Семян в ячейке | До пикировки (недель) | Появление всходов (дней) | Базовые значения pH ЕС | Присыпание семян |
|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| PEL | 288 | 1 | 5-6 | 3-4 | 5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm | Да |

Производство сеянцев

| | Стадия 1 | Стадия 2 | Стадия 3 | Стадия 4 |
|---------------------|----------------------|--|---|---|
| Увлажнение | Уровень 4 | Уровень 3-4 | Уровень 3-4 | Уровень 3 |
| Температура | 64-68°F (18-20°C) | 65-70°F (18-21°C) | 60-65°F (16-18°C) | 55-60°F (13-16°C) |
| Освещенность | Опционально | 5-8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ | 8-10 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ | 10 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ |
| Подкормки | | Менее 100ppm N - Менее 0.7 ЕС | Менее 100ppm N - Менее 0.7 ЕС | от 175 до 225 ppm N - от 1.2 до 1.5 ЕС |

Выращивание до получения готового растения

| требуемые значения pH ЕС | Подкормки | Длина дня |
|--------------------------------|--|-----------------------------|
| 5,8-6,5 pH 1,5-2,0 mmhos/cm | от 175 до 225 ppm N - от 1.2 до 1.5 ЕС | Факультативный длинный день |

Расчет выхода готовой продукции

| Тип производства | Использование сетки | Температура | Плотность посадки | Период выращивания |
|---------------------------------------|---------------------|---|--|--------------------|
| Пленочная теплица с открытыми торцами | Требуется | 16-22°C/60-72°F (day) 10-16°C/50-60°F (night) | 6-8 растений/фут ² (65-86 растений/м ²) | 11-15 недель |
| Теплица | Требуется | 16-18°C/60-65°F (day) 13-16°C/55-60°F (night) | 6-8 растений/фут ² (65-86 растений/м ²) | 11-13 недель |

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта



Black Cherry



Coral



Deep Pink
Maxine



Magenta
Bicolor




Neon Purple



Pink



Pink Magic



Purple



Purple White
Bicolor



Red



Scarlet



White



Mixture



BloomStudios.
WITH PANAMERICAN SEED®

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
info@bloomstudios.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2020 Ball Horticultural Company