

Trachelium Серии Lake

(Trachelium caeruleum)

Срезочные культуры (обновлено 13.10.23)

Общая информация

Тип производства	Использование	Длина стебля	Группа по срокам цветения
Теплица	Аранжировочная зелень	30-42 в . (76-107 cm)	N/A

Проращивание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от проращивания 50% сеянцев, до максимального проращивания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
PEL	288	1	7-9	5-7	6,0 pH 0,5-0,9 mmhos/cm	Нет

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3-4	Уровень 2-3	Уровень 2-3
Температура	62-70°F (17-21°C)	62-70°F (17-21°C)	62-70°F (17-21°C)	62-70°F (17-21°C)
Освещенность	Опционально			
Подкормки	Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)

Ключевые моменты выращивания

Трахелий очень чувствителен к высокому содержанию солей во время проращивания, особенно к высокому содержанию аммония.

Выращивание до получения готового растения

pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
6,0 pH 2,0-2,25 mmhos/cm	от 175 до 225 ppm N (от 1.2 до 1.5 EC)	Требуется длинный день

Расчет длины дня

Трахелию необходима 16-часовая продолжительность дня.

Расчет выхода готовой продукции

Тип производства	Использование сетки	Температура	Плотность посадки	Период выращивания
Теплица	Рекомендуется	16-26°C/60-78°F (day) 11-20°C/52-68°F (night)	6 растений/фут² (65 растений/м²)	10-14 недель

Распространенные проблемы

Насекомые вредители: Тля, листовёртки, трипсы
Болезни: Бактериоз, фитиум, фитофтороз, ризоктония

Дополнительная информация

Наибольший потенциал для круглогодичного производства в умеренном климате. Среднесезонная цветущая (переходная Группа 3) серия для пересадки в середине зимы - начале весны, чтобы цветение началось в конце весны - начале лета. Можно также пересаживать в конце лета - начале осени для осеннего - раннезимнего цветения.

Срезка

Собирайте стебли, когда половина или более соцветий раскрыты.

После срезки

Предпочтительны чистая вода или удерживающий раствор. Хранить при температуре 4°C (40°F). Избегайте воздействия этилена, рекомендуется использовать средства, ингибирующие этилен.

Вазостойкость


Срок сохранения срезанных цветов в вазе в среднем 11 дней. Длительное хранение в холоде сократит срок сохранения в вазе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта




Forest Purple




Michigan Blue



Michigan
Purple



Michigan Violet



Michigan White



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2024 Ball Horticultural Company