

Aquilegia Серии Earlybird™ F₁

(*Aquilegia x hybrida*)

Многолетние растения (обновлено 20.01.21)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Полутень, Солнечное	Ранняя весна, Весна, Поздняя весна, Лето	9-11 в . (23-28 cm)	8-10 в . (20-25 cm)	10-12 в . (25-30 cm)

Проращивание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от проращивания 50% сеянцев, до максимального проращивания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
RAW	288	1	6-7	7-14	5,8-6,4 pH 0,75 mmhos/cm	Опционально

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 4	Уровень 3	Уровень 2
Температура	72-77°F (22-25°C)	68-73°F (20-23°C)	65-70°F (18-21°C)	60-65°F (16-18°C)
Освещенность	Опционально	2 500 фут-свечей (26 900 Lux)	6-8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ 2 500 фут-свечей (26 900 Lux)	6-8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ 5 000 фут-свечей (53 800 Lux)
Подкормки	Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)
Регуляторы роста		анцимидол/2 ppm/Опрыскивание	анцимидол/2 ppm/Опрыскивание	анцимидол/2 ppm/Опрыскивание

Охлаждение

Да

Выращивание до получения готового растения


Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 65-68°F (18-20°C) (ночь) 50-54°F (10-12°C)	5,8-6,2 pH 1,3-1,8 mmhos/cm	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	Нейтрально к длине дня

Расчет выхода готовой продукции

Тип продукции	Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
Однолетник	4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	12-16 (недель)	Весна, СДТ(средняя дневная температура) 55°F (13°C)	даминозид/анцимидол баковая смесь 2 500-10 ppm Опрыскивание
Зимовка	4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	20-30 (недель)	Ранняя весна, СДТ(средняя дневная температура) 50°F (10°C)	даминозид/анцимидол баковая смесь 2 500-10 ppm Опрыскивание
Зимовка	5"/6"/1 Gallon	2-3 (ppp)	20-30 (недель)	Ранняя весна, СДТ(средняя дневная температура) 50°F (10°C)	даминозид/анцимидол баковая смесь 2 500-10 ppm Опрыскивание
Однолетник	5"/6"/1 Gallon	2-3 (ppp)	13-16 (недель)	Весна, СДТ(средняя дневная температура) 55°F (13°C)	даминозид/анцимидол баковая смесь 2 500-10 ppm Опрыскивание

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта




Blue White




Purple Blue




Purple White




Purple Yellow




Red White



Red Yellow



White



Yellow



Mixture

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2021 Ball Horticultural Company