

Alyssum Serie Easter Bonnet

(*Lobularia maritima*)

Cultura para Plantas Anuales (revisado 26/02/19)

Plug crop time: 4 to 5 weeks

Transplant to finish: 5 weeks

- Offering a full colour range, Easter Bonnet combines uniformity of habit and colour with unsurpassed earliness.
- Covered with dainty, fragrant flowers, plants stay compact and tidy much longer than other alyssums, making these excellent edging plants.

Información General

Ubicación	Estación de Floración	Altura	Extensión	Espacio entre Plantas
principios de primavera	principios de primavera, primavera	4-10 plg. (10-25 cm)	10-12 plg. (25-30 cm)	10-14 plg. (25-36 cm)

Germinación

Forma de Semilla	Tamaño de plug recomendado	Semillas/celda	Semanas de cultivo de plugs	Días para germinar	pH/CE inicial del medio	Cubrir semilla
COT, RAW	288	5-6	4	3-4	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Cobertura ligera

Producción de Plugs

	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4
Humedad	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 3	Nivel 2
Temperatura	70-72°F 21-22°C	65-75°F 18-24°C	65-75°F 18-24°C	60-70°F 16-21°C
Luz	Opcional	1.000-2.500 p.c. (10.800-26.900 Lux)	1.000-2.500 p.c. (10.800-26.900 Lux)	1.000-2.500 p.c. (10.800-26.900 Lux)
Fertilizante	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7		100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2	100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2

Recomendaciones Clave para Propagación

Se recomienda la siembra múltiple con 5 a 6 semillas por celda. Los reguladores de crecimiento no son generalmente requeridos para los plantines. Se recomienda incorporar un programa de fungicida preventivo para Downy Mildew en la propagación de plantines de alyssum.

Producción de Planta Terminada

Temperatura de Producción	PH/CE del Medio Deseado	Fertilizante	Horas Luz
(días) 60-75°F 16-24°C (noches) 55-60°F 13-16°C	5,8-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	175 a 225 ppm N - CE de 1.2 a 1.5	Día Neutral

Programación del cultivo

Tamaño del Recipiente	Número de Plugs	Tiempo de Cultivo	Estación	RC
Pack 306	1 (ppp)	5 (semanas)	finales de primavera	-

Notas sobre Fertilizante

Comenzando 1 semana después del trasplante, aplique fertilizante a una dosis de 175 a 225 ppm N/1.2 a 1.5 mS/cm, utilizando un fertilizante predominantemente a base de nitrato con bajo contenido en fósforo. Si es necesario, alterne con un fertilizante equilibrado a base de amonio y nitrato para estimular el crecimiento y equilibrar el pH del medio. Mantenga el medio EC entre 1.50 y 2.00 mS/cm y el pH entre 5.8 y 6.2. Los niveles excesivos de fertilizante darán como resultado hojas grandes y exuberantes y flores más pequeñas, mientras que una disminución en la fertilización causará hojas muy pequeñas, plantas duras y hojas amarillas inferiores.

Sensibilidad Química

Evitar utilizar fungicidas a base de cobre en Alyssum.

Problemas Comunes

Enfermedades: Downy Mildew. Se recomienda una aplicación preventiva de fungicida para la pudrición de bandejas.

Recomendaciones Clave para Terminar

Aplicar un fungicida (drench) en el trasplante. Cutivos de temporada fría se pueden cultivar con poco o nada de calefacción. Cultive al aire libre o a temperaturas frescas por la noche para obtener el mejor color.

NOTA: Los productores deben usar la información presentada aquí como pautas solamente. PanAmerican Seed recomienda que los productores realicen una prueba de productos en sus propias condiciones. Los tiempos de cosecha variarán según el clima, la ubicación, la época del año y las condiciones ambientales del invernadero. Es responsabilidad del productor confirmar que el tratamiento esté disponible en su región, así como leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta actual relacionadas con los productos. Nada en este documento se considerará como garantía o garantía por parte de PanAmerican Seed de los productos que se enumeran en este documento. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed se aplicarán a todos los productos enumerados en este documento.

Fotos de Variedades



Deep Pink




Deep Rose



Lemonade




Peach



Violet



White



Mixture

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.
©2019 Ball Horticultural Company