

Aurinia Gold Rush

(*Aurinia saxatilis*)

Cultura para Plantas Perennes (revisado 28/10/19)

Plug crop time: 6 to 7 weeks

Transplant to finish: 26 to 32 weeks

- Shorter-stemmed Aurinia features a more uniform plant habit and earlier flowering than the competition.
- Evergreen early-Spring flowering perennial forms neat rosettes.

Información General

Ubicación	Estación de Floración	Altura	Extensión	Espacio entre Plantas
principios de primavera	principios de primavera, primavera	5-8 plg. (13-20 cm)	5-8 plg. (13-20 cm)	10-12 plg. (25-30 cm)

Germinación

Forma de Semilla	Tamaño de plug recomendado	Semillas/celda	Semanas de cultivo de plugs	Días para germinar	pH/CE inicial del medio	Cubrir semilla
RAW	288	4	6-7	3-5	5,5-6,4 pH 1,1-1,3 mmhos/cm	No

Producción de Plugs

	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4
Humedad	Nivel 4	Nivel 3-4	Nivel 2-3	Nivel 2
Temperatura	65-72°F (18-22°C)	65-68°F (18-20°C)	65-68°F (18-20°C)	60-65°F (16-18°C)
Luz	Opcional	2.500 p.c. (26.900 Lux)	2.500 p.c. (26.900 Lux)	5.000 p.c. (53.800 Lux)
Fertilizante	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7	100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2	100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2

Vernalización

Sí - 6 a 8 semanas ADT 50 ° F (10 ° C) a partir de 10 hojas verdaderas

Juventud

Antes de 8 a 10 hojas verdaderas

Recomendaciones Clave para Propagación

Aurinia es una planta de jardín de rocas. Proporcione un buen drenaje y un clima activo con mucha luz.

Producción de Planta Terminada

Temperatura de Producción	PH/CE del Medio Deseado	Fertilizante	Horas Luz
(días) 60-65°F (16-18°C) (noches) 50-54°F (10-12°C)	5,5-6,4 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7	Día Neutral

Notas sobre Horas Luz

Día neutro

Programación del cultivo

Tipo de Cultivo	Tamaño del Recipiente	Número de Plugs	Tiempo de Cultivo	Estación	RC
Cultivo con hibernación	4/4.5 plg./Cuarto de galón	1 (ppp)	26-32 (semanas)	principios de primavera, TPD 60°F (16°C)	-

Notas sobre Fertilizante

Fertilización moderada.

Problemas Comunes

Condiciones de crecimiento demasiado mojado; usar sustratos incorrectos, con mal drenaje; pulgones; downy mildew.

Estrategia para Abultar

Necesita 10 hojas verdaderas antes de la vernalización (6 a 8 semanas ADT 50 ° F / 10 ° C)

Recomendaciones Clave para Terminar

Requiere suelo bien drenado; Evitar el invierno mojado. Evite plantar plántulas demasiado profundas (la corona debe quedar a la superficie del sustrato).

NOTA: Los productores deben usar la información presentada aquí como pautas solamente. PanAmerican Seed recomienda que los productores realicen una prueba de productos en sus propias condiciones. Los tiempos de cosecha variarán según el clima, la ubicación, la época del año y las condiciones ambientales del invernadero. Es responsabilidad del productor confirmar que el tratamiento esté disponible en su región, así como leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta actual relacionadas con los productos. Nada en este documento se considerará como garantía o garantía por parte de PanAmerican Seed de los productos que se enumeran en este documento. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed se aplicarán a todos los productos enumerados en este documento.

Fotos de Variedades



Gold Rush



Gold Rush

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.
©2020 Ball Horticultural Company