

Erysimum Serie Citrona®

(*Erysimum species*)

Cultura para Plantas Anuales (revisado 10/01/18)

Plug crop time: 4 weeks

Transplant to finish: 7 to 9 weeks

- Very floriferous, well-branched plants display bright, scented blooms in Spring and Autumn.
- No vernalization needed.
- Matches pansy production well; grow in premium packs, 4-in./10-cm pots and gallons.

Información General

Ubicación	Estación de Floración	Altura	Extensión	Espacio entre Plantas
principios de primavera	principios de primavera, primavera, otoño	10-12 plg. (25-30 cm)	10-12 plg. (25-30 cm)	10-14 plg. (25-36 cm)

Germinación

Forma de Semilla	Tamaño de plug recomendado	Semillas/celda	Semanas de cultivo de plugs	Días para germinar	pH/CE inicial del medio	Cubrir semilla
RAW	288	1	4	2-4	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Sí

Producción de Plugs

	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4
Humedad	Nivel 4	Nivel 4	Nivel 4-3	Nivel 4-2
Temperatura	68-72°F 20-22°C	65-70°F 18-21°C	60-65°F 16-18°C	55-60°F 13-16°C
Luz	Opcional	2.500-3.000 p.c. (26.900-32.300 Lux)	2.500-3.000 p.c. (26.900-32.300 Lux)	2.500-3.000 p.c. (26.900-32.300 Lux)
Fertilizante			Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7	100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2
RC	paclobutrazol/10 ppm/espray			

Producción de Planta Terminada

Temperatura de Producción	PH/CE del Medio Deseado	Fertilizante	Horas Luz
(días) 65-70°F/18-21°C (noches) 55-60°F/13-16°C	5,8-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	225 a 300 ppm N - CE de 1.5 a 2.0	Día Largo Facultativo

Programación del cultivo


Tamaño del Recipiente	Número de Plugs	Tiempo de Cultivo	Estación	RC
4/4.5 plg./Cuarto de galón	1 (ppp)	7-8 (semanas)	principios de primavera	mezcla en tanque daminozide/cloruro de cloromequat 2.500/1.000 ppm espray
4/4.5 plg./Cuarto de galón	1 (ppp)	5 (semanas)	otoño	paclobutrazol 20 ppm espray

Recomendaciones Clave para Terminar

Erysimum se desempeña bien cuando se produce con temperaturas frescas.

NOTA: El productor deberá utilizar la información presentada únicamente como una guía. PanAmerican Seed recomienda que el productor realice ensayos bajo sus condiciones de producción. El tiempo de cultivo varía dependiendo del clima, lugar de producción, época del año y condiciones ambientales en el invernadero. Es responsabilidad del productor leer y seguir las instrucciones en la etiqueta del producto. Nada de lo aquí expuesto se considerará garantía de los productos por parte de Pan American Seed. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed aplican a todos los productos aquí incluidos.

Fotos de Variedades



Orange



Yellow

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.
©2018 Ball Horticultural Company