

Helenium Dakota Gold

(*Helenium amarum*)

Cultura para Plantas Anuales (revisado 10/01/18)

Plug crop time: 3 to 4 weeks

Transplant to finish: 5 to 7 weeks

- Easy-care variety performs from hot and dry to cool and rainy.
- Strong-growing and compact, mounded plants are covered with bright golden yellow blooms over fine-textured foliage.
- Quick crop time.
- Grow under long days for the best habit and vigour.

North Texas Winner's Circle Award; Japan Flower Selections Certificate of Merit as Best Flower Award

Información General

Ubicación	Estación de Floración	Altura	Extensión	Espacio entre Plantas
principios de primavera	finales de primavera, verano, finales de verano, otoño	12-14 plg. (30-36 cm)	24-28 plg. (61-71 cm)	24-30 plg. (61-76 cm)

Germinación

Forma de Semilla	Tamaño de plug recomendado	Semillas/celda	Semanas de cultivo de plugs	Días para germinar	pH/CE inicial del medio	Cubrir semilla
MPL	288	1	3-4	3-5	5,5-6,3 pH 0,75 mmhos/cm	Sí

Producción de Plugs

	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4
Humedad	Nivel 4	Nivel 3-4	Nivel 2-3	Nivel 2-3
Temperatura	65-75°F 18-24°C	68-72°F 20-22°C	68-72°F 20-22°C	68-72°F 20-22°C
Luz	Opcional			
Fertilizante	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7		100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2	100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2

Recomendaciones Clave para Propagación

El número de horas luz afecta el hábito y tiempo de cultivo. Vea la Guía de cultivo para obtener mayores detalles.

Producción de Planta Terminada

Temperatura de Producción	PH/CE del Medio Deseado	Fertilizante	Horas Luz
(días) 65-70°F 18-21°C (noches) 64-66°F 18-19°C	5,5-6,5 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	175 a 225 ppm N - CE de 1.2 a 1.5	Día Largo Facultativo

Notas sobre Horas Luz

Las plantas florecen sin importar el número de horas luz, sin embargo, el hábito de la planta está relacionado a las horas luz. Las plantas crecen lentamente cuando se producen bajo días con menos de 12 horas luz, y se aplanan o rosetan con producción de menos de 10 horas luz. Se recomienda producir las plantas bajo días largos (12 horas luz o más).

Programación del cultivo

Tamaño del Recipiente	Número de Plugs	Tiempo de Cultivo	Estación	RC
Pack 306	1 (ppp)	5-7 (semanas)	primavera	daminozide 5.000 ppm espray
4/4.5 plg./Cuarto de galón	1 (ppp)	5-7 (semanas)	primavera	daminozide 5.000 ppm espray
5/6 plg./Galón	1 (ppp)	6-8 (semanas)	primavera	daminozide 5.000 ppm espray

NOTA: El productor deberá utilizar la información presentada únicamente como una guía. PanAmerican Seed recomienda que el productor realice ensayos bajo sus condiciones de producción. El tiempo de cultivo varía dependiendo del clima, lugar de producción, época del año y condiciones ambientales en el invernadero. Es responsabilidad del productor leer y seguir las instrucciones en la etiqueta del producto. Nada de lo aquí expuesto se considerará garantía de los productos por parte de Pan American Seed. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed aplican a todos los productos aquí incluidos.

Fotos de Variedades



Dakota Gold



Dakota Gold

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.
©2018 Ball Horticultural Company