

Heuchera Palace Purple

(*Heuchera micrantha*)

Cultura para Plantas Perennes (revisado 20/01/21)

Información General

Ubicación	Estación de Floración	Altura	Extensión	Espacio entre Plantas
primavera, finales de primavera	verano, finales de verano	10-20 plg. (25-51 cm)	14-16 plg. (36-41 cm)	24-36 plg. (61-91 cm)

Germinación

Tipo de Semilla	Tamaño de plug recomendado	Semillas/celda	Semanas de cultivo de plugs	días desde el 50% hasta la germinación máxima	pH/CE Inicial del sustrato (1:2)	Cubrir semilla
PEL	288 128*	4 6	6-8 8-9	7-10	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	No

* Tamaño de plug recomendado para forzar

Producción de Plugs

	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4
Humedad	Nivel 4-5	Nivel 4-3	Nivel 3	Nivel 2
Temperatura	68-72°F (20-22°C)	65-68°F (18-20°C)	65-68°F (18-20°C)	60-65°F (16-18°C)
Luz	Luz	2.000-2.500 p.c. (21.500-26.900 Lux)	2.000-2.500 p.c. (21.500-26.900 Lux)	2.500-3.500 p.c. (26.900-37.700 Lux)
Fertilizante		Menos de 100 ppm N (CE menor a 0,7)	100 a 175 ppm N (CE de 0,7 a 1,2)	Menos de 100 ppm N (CE menor a 0,7)

Vernalización

No - No requiere vernalización cuando se vende por su follaje.

Recomendaciones Clave para Propagación

Para obtener información para forzar: Vea la Guía para Forzar Perennes

Se recomienda la aplicación de un fungicida.

NOTA: Palace Purple es más rápido de producir como almácigo y como planta terminada que Melting Fire.

Producción de Planta Terminada

Temperatura de Producción	pH/CE Objetivo del sustrato (1:2)	Fertilizante	Horas Luz
(días) 65-68°F (18-20°C) (noches) 60-65°F (16-18°C)	5,8-6,2 pH 1,2-1,4 mmhos/cm	175 a 225 ppm N (CE de 1,2 a 1,5)	Día Neutral

Programación del cultivo

Tipo de Cultivo	Tamaño del Recipiente	Número de Plugs	Tiempo de Cultivo	Estación	RC
Forzado	4/4.5 plg./Cuarto de galón	1 (ppp)	10-11 (semanas)	finales de primavera, TPD 68°F (20°C)	-
Forzado	4/4.5 plg./Cuarto de galón	1 (ppp)	9-10 (semanas)	otoño, TPD 68°F (20°C)	-
Forzado	5/6 plg./Galón	1-2 (ppp)	10-11 (semanas)	otoño, TPD 68°F (20°C)	-
Cultivo con hibernación	5/6 plg./Galón	1 (ppp)	26-32 (semanas)	primavera	-
Cultivo con hibernación	5/6 plg./Galón	1-3 (ppp)	28-32 (semanas)	primavera	-
Forzado	5/6 plg./Galón	1-2 (ppp)	11-12 (semanas)	finales de primavera, TPD 68°F (20°C)	-

Notas sobre Fertilizante

Fertilice riego de por medio con 15-0-15 a 150-200 ppm nitrógeno. Mantenga una conductividad eléctrica en el sustrato de aproximadamente 1 mmhos/cm (utilizando una extracción 1:2)

Problemas Comunes

Insectos: nemátodos de hojas. Enfermedades: Mildiu polvoso (Powdery mildew), botritis, manchas foliares, oxidación y pudrición de raíz.

Recomendaciones Clave para Terminar

No trasplante los almácigos demasiado profundos. Mantenga la superficie del almácigo al mismo nivel que la superficie del sustrato. Evite que el sustrato esté mojado o muy seco. Requiere un sustrato con buen drenaje.

NOTA: Los productores deben usar la información presentada aquí como pautas solamente. PanAmerican Seed recomienda que los productores realicen una prueba de productos en sus propias condiciones. Los tiempos de cosecha variarán según el clima, la ubicación, la época del año y las condiciones ambientales del invernadero. Es responsabilidad del productor confirmar que el tratamiento esté disponible en su region, así como leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta actual relacionadas con los productos. Nada en este documento se considerará como garantía o garantía por parte de PanAmerican Seed de los productos que se enumeran en este documento. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed se aplicarán a todos los productos enumerados en este documento.

Fotos de Variedades



Palace Purple

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.
©2021 Ball Horticultural Company