

Impatiens Serie Impreza™ F₁

(*Impatiens walleriana*)

Cultura para Plantas Anuales (revisado 09/01/19)

Plug crop time: 4 to 5 weeks

Transplant to finish: 3 to 4 weeks

- One of the most grower and retailer-friendly series available offers a streamlined range of top-selling colours.
- Reduced apical dominance, decreased internode length and good soil coverage produce easy-to-manage plants with less upward stretch and potentially need fewer growth regulators – perfect for high-density programs.
- Long shelf life for extended sales and reduced dump.
- All colours finish in a 5 to 7-day window for efficient shipping and flexibility, letting you adjust the colour assortment to meet seasonal/regional and market needs.
- Good garden fill – plants stay full and nice-looking all season with less lodging.

Información General

Ubicación	Estación de Floración	Altura	Extensión	Espacio entre Plantas
primavera, principios de primavera	primavera, finales de primavera, verano, finales de verano	6-8 plg. (15-20 cm)	12-14 plg. (30-36 cm)	8-10 plg. (20-25 cm)

Germinación

Forma de Semilla	Tamaño de plug recomendado	Semillas/celda	Semanas de cultivo de plugs	Días para germinar	pH/CE inicial del medio	Cubrir semilla
RAW	288	1	4-5	3-5	6,0-6,2 pH 0,5-0,75 mmhos/cm	No

Producción de Plugs

	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4
Humedad	Nivel 4-5	Nivel 2-4	Nivel 2-3	Nivel 2-3
Temperatura	72-76°F 22-24°C	70-72°F 21-22°C	68-70°F 20-21°C	62-65°F 17-18°C
Luz	Opcional	450-700 p.c. (4.800-7.500 Lux)	450-700 p.c. (4.800-7.500 Lux)	450-700 p.c. (4.800-7.500 Lux)
Fertilizante		Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7

Recomendaciones Clave para Propagación

No cubra la semilla.

Producción de Planta Terminada

Temperatura de Producción	PH/CE del Medio Deseado	Fertilizante	Horas Luz
(días) 70-75°F/21-24°C (noches) 62-68°F/17-20°C	6,2-6,5 pH 0,75-1,0 mmhos/cm	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7	Día Neutral

Programación del cultivo

Tamaño del Recipiente	Número de Plugs	Tiempo de Cultivo	Estación	RC
Pack 306	1 (ppp)	3-4 (semanas)	primavera	-
4/4.5 plg./Cuarto de galón	1 (ppp)	4-5 (semanas)	primavera	-
10 plg. o Canasta colgante/3 Galón	3-5 (ppp)	8-10 (semanas)	primavera	-

Recomendaciones Clave para Terminar

Las plantas de impatiens muestran respuesta a daminozide, paclobutrazol y uniconazol. El monitoreo del uso de agua y fertilización pueden ayudar a controlar el crecimiento y vigor de las plantas.

NOTA: El productor deberá utilizar la información presentada únicamente como una guía. PanAmerican Seed recomienda que el productor realice ensayos bajo sus condiciones de producción. El tiempo de cultivo varía dependiendo del clima, lugar de producción, época del año y condiciones ambientales en el invernadero. Es responsabilidad del productor leer y seguir las instrucciones en la etiqueta del producto. Nada de lo aquí expuesto se considerará garantía de los productos por parte de Pan American Seed. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed aplican a todos los productos aquí incluidos.

Fotos de Variedades



Blue Pearl



Cherry Splash




Pink




Punch



Rose



Salmon



Violet



White



Passion Mixture



Red White
Mixture



Select Mixture



Wedgewood
Mixture

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.
©2019 Ball Horticultural Company