

Pepper Cajun Belle  
(Capsicum annuum)

Cultura para Plantas Vegetales (revisado 01/11/23)

Información General

| Ubicación               | Estación de Floración | Altura             | Extensión          | Espacio entre Plantas    |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| principios de primavera | -                     | 24 plg.<br>(61 cm) | 24 plg.<br>(61 cm) | 16-22 plg.<br>(41-56 cm) |

Germinación

| Tipo de Semilla | Tamaño de plug recomendado | Semillas/celda | Semanas de cultivo de plugs | días desde el 50% hasta la germinación máxima | pH/CE Inicial del sustrato (1:2) | Cubrir semilla   |
|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| RAW             | 288                        | 1              | 5-6                         | 5-7                                           | 5,8-6,2 pH<br>0,75 mmhos/cm      | Cobertura ligera |

Producción de Plugs

|              | Etapla 1                               | Etapla 2                                | Etapla 3                                | Etapla 4                                |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Humedad      | Nivel 4                                | Nivel 3-4                               | Nivel 2-4                               | Nivel 2-4                               |
| Temperatura  | 70-78°F<br>(21-26°C)                   | 68-72°F<br>(20-22°C)                    | 65-70°F<br>(18-21°C)                    | 62-67°F<br>(17-19°C)                    |
| Luz          | Opcional                               | 1.000-2.500 p.c.<br>(10.800-26.900 Lux) | 1.000-2.500 p.c.<br>(10.800-26.900 Lux) | 2.500-5.000 p.c.<br>(26.900-53.800 Lux) |
| Fertilizante | Menos de 100 ppm N<br>(CE menor a 0,7) | Menos de 100 ppm N<br>(CE menor a 0,7)  | 100 a 175 ppm N<br>(CE de 0,7 a 1,2)    | 100 a 175 ppm N<br>(CE de 0,7 a 1,2)    |

Notas sobre Fertilizante

Los chiles son muy sensibles a los niveles altos de sales, en particular amonio alto, durante la germinación. Mantenga los niveles de amonio inferiores a 10 ppm.

Recomendaciones Clave para Propagación

La altura puede controlarse limitando el fertilizante, evitando el riego excesivo, produciendo bajo condiciones de luz alta y utilizando DIF, cuando sea posible. De ser necesario, puede aplicarse uniconazole (Sumagic) a una dosis de 2,5 a 5 ppm 2 semanas después del trasplante para controlar la altura. Repita 2 semanas después, si es necesario.

Producción de Planta Terminada

| Temperatura de Producción                              | pH/CE Objetivo del sustrato (1:2) | Fertilizante                         | Horas Luz |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| (días) 68-80°F (20-27°C)<br>(noches) 65-70°F (18-21°C) | 5,5-6,2 pH<br>1,0 mmhos/cm        | 100 a 175 ppm N<br>(CE de 0,7 a 1,2) | -         |

Días a Fruto Verde

45-50

Días a Fruto Maduro

60-65

## Programación del cultivo

| Tamaño del Recipiente      | Número de Plugs | Tiempo de Cultivo | Estación  | RC |
|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------|----|
| Pack 306                   | 1 (ppp)         | 4-6 (semanas)     | primavera | -  |
| 4/4,5 plg./Cuarto de galón | 1 (ppp)         | 4-6 (semanas)     | primavera | -  |
| 5/6 plg./Galón             | 1 (ppp)         | 5-7 (semanas)     | primavera | -  |

### Recomendaciones Clave para Terminar

Se desarrolla bien en el suelo o en un recipiente pequeño, con o sin soporte.

**NOTA:** Los productores deben usar la información presentada aquí como pautas solamente. PanAmerican Seed recomienda que los productores realicen una prueba de productos en sus propias condiciones. Los tiempos de cosecha variarán según el clima, la ubicación, la época del año y las condiciones ambientales del invernadero. Es responsabilidad del productor confirmar que el tratamiento esté disponible en su región, así como leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta actual relacionadas con los productos. Nada en este documento se considerará como garantía o garantía por parte de PanAmerican Seed de los productos que se enumeran en este documento. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed se aplicarán a todos los productos enumerados en este documento.

## Fotos de Variedades



Cajun Belle



PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185  
+1 800-231-7065 [PanAmSeed.com](http://PanAmSeed.com)

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.  
©2026 Ball Horticultural Company