

Plectranthus Silver Shield

(*Plectranthus argentatus*)

Cultura para Plantas Anuales (revisado 10/01/18)

Plug crop time: 5 to 6 weeks

Transplant to finish: 8 to 9 weeks

- Robust, vigorous and stress-tolerant accent plants have a bushy, upright habit, excellent in landscapes and combination planters.
- Economical, easy-to-produce seed-grown plants offer better branching than vegetative varieties, with no pinching needed.

Información General

Ubicación	Estación de Floración	Altura	Extensión	Espacio entre Plantas
principios de primavera, finales de primavera	-	24-30 plg. (61-76 cm)	24-30 plg. (61-76 cm)	24-32 plg. (61-81 cm)

Germinación

Forma de Semilla	Tamaño de plug recomendado	Semillas/celda	Semanas de cultivo de plugs	Días para germinar	pH/CE inicial del medio	Cubrir semilla
PEL	288	1	5-6	5-7	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	No

Producción de Plugs

	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4
Humedad	Nivel 4	Nivel 3-4	Nivel 2-3	Nivel 2-3
Temperatura	64-72°F 18-22°C	68-72°F 20-22°C	68-72°F 20-22°C	65-72°F 18-22°C
Luz	Luz	1.000-2.500 p.c. (10.800-26.900 Lux)	2.500-5.000 p.c. (26.900-53.800 Lux)	2.500-5.000 p.c. (26.900-53.800 Lux)
Fertilizante	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7		100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2	100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2
RC	daminozide/2.500 ppm/espray			

Recomendaciones Clave para Propagación

No requiere despuntes. De ser necesario, se puede hacer un espray de daminozide para entonar los plugs. Las aplicaciones de daminozide a dosis de 600 a 1,500 ppm son la mejor opción para condiciones del norte de Europa.

Producción de Planta Terminada

Temperatura de Producción	PH/CE del Medio Deseado	Fertilizante	Horas Luz
(días) 64-80°F 18-27°C (noches) 61-68°F 16-20°C	5,8-6,2 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	175 a 225 ppm N - CE de 1.2 a 1.5	-

Programación del cultivo

Tamaño del Recipiente	Número de Plugs	Tiempo de Cultivo	Estación	RC
4/4.5 plg./Cuarto de galón	1 (ppp)	8-9 (semanas)	primavera	daminozide 2.500-5.000 ppm espray
5/6 plg./Galón	1-2 (ppp)	9-10 (semanas)	primavera	daminozide 2.500-5.000 ppm espray

Notas sobre Fertilizante

Aplique fertilizante a dosis 3 (175 a 225 ppm N/1.2 a 1.5 mS/cm EC) una vez por semana utilizando fertilizante a base de nitrato, bajo en fósforo. También puede aplicarse fertilizante balanceado a base de amonio y nitrato conforme se requiera. Para programas de fertilización constante, se puede aplicar fertilizante a dosis 2 (100 a 175 ppm N/0.7 a 1.2 mS/cm) manteniendo la CE y el pH recomendados anteriormente.

Recomendaciones Clave para Terminar

No requiere despuntes. Repita la aplicación de reguladores de crecimiento, si se requiere. Para producción de macetas pequeñas o con luz baja se requiere una concentración más alta de reguladores de crecimiento.

NOTA: El productor deberá utilizar la información presentada únicamente como una guía. PanAmerican Seed recomienda que el productor realice ensayos bajo sus condiciones de producción. El tiempo de cultivo varía dependiendo del clima, lugar de producción, época del año y condiciones ambientales en el invernadero. Es responsabilidad del productor leer y seguir las instrucciones en la etiqueta del producto. Nada de lo aquí expuesto se considerará garantía de los productos por parte de Pan American Seed. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed aplican a todos los productos aquí incluidos.

Fotos de Variedades



Silver Shield



Silver Shield



Silver Shield

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.
©2018 Ball Horticultural Company