

## Plectranthus Silver Crest

(*Plectranthus argentatus*)

Cultura para Plantas Anuales (revisado 10/01/18)

**Plug crop time:** 5 to 6 weeks

**Transplant to finish:** 4 to 6 weeks

- Compact accent plant is an easy and economical choice for mixed containers, baskets and landscapes.
- Tolerant of heat and water stress.
- Silvery green, fuzzy foliage and small, blush white flowers on well-branched, trailing plants.

### Información General

Ubicación	Estación de Floración	Altura	Extensión	Espacio entre Plantas
finales de primavera, principios de primavera	primavera, finales de primavera, verano	8-10 plg. (20-25 cm)	18-24 plg. (46-61 cm)	18-24 plg. (46-61 cm)

### Germinación

Forma de Semilla	Tamaño de plug recomendado	Semillas/celda	Semanas de cultivo de plugs	Días para germinar	pH/CE inicial del medio	Cubrir semilla
RAW	288	1	5-6	4-5	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	No

### Producción de Plugs

	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4
<b>Humedad</b>	Nivel 4	Nivel 3-4	Nivel 2-3	Nivel 2-3
<b>Temperatura</b>	64-72°F 18-22°C	68-72°F 20-22°C	68-72°F 20-22°C	65-72°F 18-22°C
<b>Luz</b>	Luz	1.000-2.500 p.c. (10.800-26.900 Lux)	2.500-5.000 p.c. (26.900-53.800 Lux)	2.500-5.000 p.c. (26.900-53.800 Lux)
<b>Fertilizante</b>	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7		100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2	100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2
<b>RC</b>	daminozide/600-1.200 ppm/espray			

### Recomendaciones Clave para Propagación

No requiere despuntes. De ser necesario, se puede hacer un espray de daminozide para entonar los plugs.

### Producción de Planta Terminada

Temperatura de Producción	PH/CE del Medio Deseado	Fertilizante	Horas Luz
(días) 64-80°F/18-27°C (noches) 61-68°F/16-20°C	5,8-6,2 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	175 a 225 ppm N - CE de 1.2 a 1.5	-

### Programación del cultivo

Tamaño del Recipiente	Número de Plugs	Tiempo de Cultivo	Estación	RC
4/4.5 plg./Cuarto de galón	1 (ppp)	4-6 (semanas)	primavera	daminozide 2.500-5.000 ppm espray
10 plg. o Canasta colgante/3 Galón	3 (ppp)	6-7 (semanas)	primavera	daminozide 2.500-5.000 ppm espray

## Notas sobre Fertilizante

Aplique fertilizante a dosis 3 (175 a 225 ppm N/1.2 a 1.5 mS/cm EC) una vez por semana utilizando fertilizante a base de nitrato, bajo en fósforo. También puede aplicarse fertilizante balanceado a base de amonio y nitrato conforme se requiera. Para programas de fertilización constante, se puede aplicar fertilizante a dosis 2 (100 a 175 ppm N/0.7 a 1.2 mS/cm) manteniendo la CE y el pH recomendados anteriormente.

## Recomendaciones Clave para Terminar

No requiere despuntes. Debido al arco direccional del tallo, se recomienda colocar los plugs con el brote de crecimiento hacia fuera del recipiente. Si se requiere, repita la aplicación de reguladores de crecimiento. Para macetas pequeñas o producción con luz baja, se requiere mayor concentración de reguladores de crecimiento.

**NOTA:** El productor deberá utilizar la información presentada únicamente como una guía. PanAmerican Seed recomienda que el productor realice ensayos bajo sus condiciones de producción. El tiempo de cultivo varía dependiendo del clima, lugar de producción, época del año y condiciones ambientales en el invernadero. Es responsabilidad del productor leer y seguir las instrucciones en la etiqueta del producto. Nada de lo aquí expuesto se considerará garantía de los productos por parte de Pan American Seed. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed aplican a todos los productos aquí incluidos.

## Fotos de Variedades

---



Silver Crest



Silver Crest



Silver Crest



Silver Crest

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.  
©2018 Ball Horticultural Company