

Scabiosa Pink Diamonds

(*Scabiosa japonica* var. *alpina*)

Cultura para Plantas Perennes (revisado 22/02/19)

Plug crop time: 6 to 8 weeks

Transplant to finish: 13 to 15 weeks

- Good companion to Blue Note.
- Plants maintain a perfect, well-branched shape all season.
- Long-flowering with dense, rich dark green leaves.

Información General

| Ubicación | Estación de Floración | Altura | Extensión | Espacio entre Plantas |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| principios de primavera | primavera, finales de primavera, verano, finales de verano | 8-10 plg. (20-25 cm) | 8-10 plg. (20-25 cm) | 10-18 plg. (25-46 cm) |

Germinación

| Forma de Semilla | Tamaño de plug recomendado | Semillas/celda | Semanas de cultivo de plugs | Días para germinar | pH/CE inicial del medio | Cubrir semilla |
|------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| RAW | 288 128* | 2-3 4-5 | 6-8 8-9 | 8-10 | 5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm | Sí |

* Tamaño de plug recomendado para forzar

Producción de Plugs

| | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 |
|---------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| Humedad | Nivel 4 | Nivel 3 | Nivel 2 | Nivel 2 |
| Temperatura | 65-68°F (18-20°C) | 65-68°F (18-20°C) | 60-65°F (16-18°C) | 60-65°F (16-18°C) |
| Luz | Oscuridad | 2.000-2.500 p.c. (21.500-26.900 Lux) | 2.000-2.500 p.c. (21.500-26.900 Lux) | 4.000-5.000 p.c. (43.100-53.800 Lux) |
| Fertilizante | Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7 | Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7 | 100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2 | 100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2 |

Vernalización

No

Recomendaciones Clave para Propagación

Requiere abultamiento en días cortos (10 horas) para forzar, y una temperatura de 62 a 65°F (17 a 18°C) durante 6 semanas.

Para obtener información para forzar: Vea la Guía para Forzar Perennes.

Realice un spray de fungicida para evitar la pudrición de las plántulas.

Producción de Planta Terminada

| Temperatura de Producción | PH/CE del Medio Deseado | Fertilizante | Horas Luz |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| (días) 65-68°F (18-20°C) (noches) 60-65°F (16-18°C) | 5,8-6,2 pH 1,1-1,3 mmhos/cm | 100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2 | Día Neutral |

Programación del cultivo

| Tipo de Cultivo | Tamaño del Recipiente | Número de Plugs | Tiempo de Cultivo | Estación | RC |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----|
| Cultivo anual | 4/4.5 plg./Cuarto de galón | 1 (ppp) | 12-14 (semanas) | finales de primavera | - |
| Cultivo con hibernación | 4/4.5 plg./Cuarto de galón | 1 (ppp) | 26-34 (semanas) | primavera | - |
| Cultivo anual | 5/6 plg./Galón | 3-4 (ppp) | 12-14 (semanas) | finales de primavera | - |

Notas sobre Fertilizante

Aplice fertilizante de dosis 1 a 2 (100 a 125 ppm N/CE 1.2 a 1.5 mmhos/cm) o 150 ppm, conforme sea necesario. Mantenga el pH de 5.5 a 6.2.

Problemas Comunes

Insectos: áfidos, ácaros Enfermedades: Botrytis, mildew polvoriento, pudrición de raíz. Evite plantar los plugs demasiado profundo.

Recomendaciones Clave para Terminar

Requiere luz alta y HR baja. Produzca ligeramente seca. Prevenga la deficiencia de Mg y Fe. Para forzar a principios de primavera, es necesario elevar la temperatura durante 6 semanas a entre 62 y 65°F (17 y 18°C), no días largos. Para obtener información para forzar para el Días de las Madres: Vea la Guía para Forzar Perennes.

NOTA: Los productores deben usar la información presentada aquí como pautas solamente. PanAmerican Seed recomienda que los productores realicen una prueba de productos en sus propias condiciones. Los tiempos de cosecha variarán según el clima, la ubicación, la época del año y las condiciones ambientales del invernadero. Es responsabilidad del productor confirmar que el tratamiento esté disponible en su region, así como leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta actual relacionadas con los productos. Nada en este documento se considerará como garantía o garantía por parte de PanAmerican Seed de los productos que se enumeran en este documento. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed se aplicarán a todos los productos enumerados en este documento.

Fotos de Variedades



Pink Diamonds



Pink Diamonds

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.
©2019 Ball Horticultural Company